


Qu'est-ce que CASODEX®

Description de la molécule	Description
Bicalutamide	<p>Comprimé de 50 mg, rond, blanc</p> <p>Des génériques de différentes formes existent</p> 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de mg/jour, soit comprimé(s), à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés

A heure fixe. Pendant ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas									
En continu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...	<input checked="" type="checkbox"/>
	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7		J28

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre fonction hépatique) et clinique .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CASODEX® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES	
Les plus fréquents	Troubles digestifs : perte d'appétit, douleurs abdominales, constipation, nausées, vomissements Bouffées de chaleur Sensibilité et gonflement des seins Baisse de la libido Anomalie du bilan : anémie (baisse de l'hémoglobine dans le sang), sang dans les urines Fatigue Œdèmes (gonflement des jambes), prise de poids Troubles neurologiques : vertiges, somnolence, dépression Éruption cutanée
QUAND ALERTER L'ÉQUIPE MÉDICALE?	

<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p>Symptômes d'un trouble au niveau des poumons > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire Douleurs intenses dans le ventre Sang dans les urines Symptômes d'une allergie > Démangeaisons avec éruption > Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge, entraînant des difficultés pour avaler ou respirer Symptômes d'un trouble de la fonction hépatique > Jaunisse Symptômes d'un trouble cardiaque > Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique Troubles de la libido Symptômes d'une dépression</p>
---	---

COMMENT PRÉVENIR LES EFFETS INDÉSIRABLES?

<p>Bouffées de chaleur</p>	<p>Pratiquez une activité physique adaptée. Évitez les sources de chaleur.</p>
<p>Soins de la peau</p>	<p>Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Évitez toute utilisation de produits irritants. <i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et évitez les expositions.</p>
<p>Fatigue</p>	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.</p>
<p>Œdèmes (gonflement des jambes)</p>	<p>Évitez les vêtements, chaussettes, et chaussures trop serrés. Surélevez vos pieds. Surveillez votre poids en cas d'œdème.</p>

COMMENT ADAPTER SON ALIMENTATION?

<p>Bouffées de chaleur</p>	<p>Évitez la consommation d'aliments épicés, avec de l'alcool ou de la caféine. Buvez des boissons froides et de façon abondante.</p>
<p>Nausées</p>	<p>Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés.</p>
<p>Œdèmes</p>	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en sel.</p>