


### Qu'est-ce que COTELLIC®

Description de la molécule	Description
Cobimetinib	Comprimé de 20 mg : blanc, rond 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de ..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de 20 mg à prendre en 1 prise par jour pendant 3 semaines toutes les 4 semaines (7 jours d'arrêt).

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A heure fixe, pendant ou en dehors des repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas						
J1 - J21, reprise à J29	 J1	...	 J21	 J22	...	 J28

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant

de surveiller votre numération formule sanguine, votre fonction hépatique, vos CPK) et clinique (suivi régulier par un ophtalmologue et un dermatologue, scintigraphie cardiaque, électro-cardiogramme).

## Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

## Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre COTELLIC® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

*Exemple* : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec COTELLIC®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

EFFETS INDÉSIRABLES	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : diarrhées, nausées, vomissements</p> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b> : modification de la vision, vision floue, décollement de la rétine</p> <p><b>Anomalie du bilan sanguin</b> : baisse des globules rouge (anémie), anomalies du bilan hépatique et des CPK</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruption cutanée, acné, sensibilité au soleil</p> <p><b>Autres</b> : hypertension artérielle, saignements, fièvre, frissons</p>

<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>&gt; Hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Diminution de la vision</li> <li>&gt; Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Troubles musculaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Douleurs ou contractions inhabituelles et inexplicables dans les muscles (élévation des CPK)</li> </ul> <p><b>Troubles cardiaques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique</li> <li>&gt; Perte de connaissance, palpitations</li> <li>&gt; Gonflement au niveau des jambes</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>&gt; Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul>
<p><b>COMMENT PRÉVENIR LES EFFETS INDÉSIRABLES?</b></p>	
<p>Soins de la peau</p>	<p><b>Privilégiez</b> <i>pour la toilette</i> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p><b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.</p> <p>Pour se <i>protéger du soleil</i>, <b>évitez</b> les expositions. <b>Portez</b> des vêtements couvrant et un chapeau, <b>utilisez</b> un écran total.</p>
<p>Poids</p>	<p><b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs</p>
<p>Suivi de la tension</p>	<p>Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.</p>
<p>Saignements, hémorragies</p>	<p><b>Évitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...)</p> <p><b>Informez</b> votre médecin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose</li> <li>&gt; en cas d'<i>intervention chirurgicale</i> ou <i>dentaire</i></li> </ul>

Fatigue	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p><b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
Infection	<p>Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera</p>
<b>COMMENT ADAPTER VOTRE ALIMENTATION?</b>	
Diarrhées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p><b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés</p>