


### Qu'est-ce que TASIGNA®

Description de la molécule	Description
Nilotinib	<p>Gélule de 150 mg : rouge Gélule de 200 mg : jaune</p> 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.



Dans votre cas, elle est de ..... mg / jour soit ..... gélules de 150 mg et/ou ..... gélules (s) de 200 mg.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules.

A heure fixe. A distance des repas (1h avant ou 2h après le repas).

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

2 fois par jour, à heure fixe, 1 h avant ou 2 h après le repas	
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant

de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos d'électrolytes comme le potassium, votre glycémie, votre cholestérol, et vos fonctions hépatique et pancréatique) et clinique (tension artérielle, électrocardiogramme).

## Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

## Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre TASIGNA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

*Exemple* : Evitez la consommation de Millepertuis, pamplemousse, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Passiflore avec TASIGNA®.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

LES EFFETS INDÉSIRABLES	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissements, diarrhées, constipation et douleurs abdominales</p> <p><b>Troubles généraux</b> : gonflements des membres et/ou du visage</p> <p><b>Anomalie du bilan biologique</b> : baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), anomalie du bilan hépatique et pancréatique, augmentation du cholestérol et des triglycérides</p> <p><b>Douleurs</b> : douleurs dans les muscles et articulations, maux de tête</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruptions cutanées, sécheresse cutanée, démangeaisons et chute des cheveux</p> <p><b>Troubles au niveau cardiaque</b> : battements de cœur forts, rapides ou irréguliers, essoufflement, douleurs dans la poitrine</p> <p><b>Fatigue</b></p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	<p>Patients porteurs du virus de l'hépatite B</p> <p>Patients aux antécédents de troubles du rythme cardiaque</p>
QUAND ALERTER L'ÉQUIPE MÉDICALE?	

<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> <li>&gt; Moins de 3 selles par semaine</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête</li> <li>&gt; Douleurs articulaires</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une rétention d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Augmentation rapide et inattendue de votre poids</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique</li> </ul>
<p><b>COMMENT PRÉVENIR LES EFFETS INDÉSIRABLES</b></p>	
<p>Soins de la peau</p>	<p><b>Privilégiez</b> pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.  <b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.  <i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p>
<p>Poids</p>	<p><b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou de rétention d'eau</p>
<p>Rétention d'eau (gonflement des membres)</p>	<p><b>Évitez</b> les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés.  <b>Surélevez</b> vos pieds.</p>
<p>Infection</p>	<p><b>Évitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera</p>
<p>Constipation</p>	<p>Pour stimuler le transit, <b>pratiquez</b> une activité physique adaptée et régulière.</p>
<p>Fatigue</p>	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...  <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
<p>Douleurs articulaires</p>	<p><b>Pratiquez</b> une activité physique adaptée.</p>

Chute des cheveux	<p><b>Utilisez</b> un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité.</p> <p><b>Privilégiez</b> une brosse souple.</p> <p><b>Evitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment. <b>Evitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.</p>
<b>COMMENT ADAPTER VOTRE ALIMENTATION?</b>	
Diarrhée	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p><b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés</p>
Rétention d'eau	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en sel.
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Troubles de la fonction pancréatique	<b>Evitez</b> la consommation d'alcool