



DAROLUTAMIDE - NUBEQA®

Qu'est-ce que NUBEQA

Description de la molécule	Description
Darolutamide	comprimé blanc à blanc cassé, ovale, 16 mm de long sur 8 mm de large

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit comprimés demg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper ou disperser les comprimés

A prendre à heure fixe, au moment du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, au cours du repas	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (Prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, fonctions rénale et hépatique.) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 7 jours après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre NUBEQA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de millepertuis ou de jus de pamplemousse.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Anomalies du bilan biologique: Neutropénie</p> <p>Anomalies du bilan hépatique: élévation ASAT, ALAT, bilirubine</p> <p>Troubles généraux: Fatigue, asthénie</p> <p>Troubles cutanés: éruption cutanée</p> <p>Troubles au niveau cardiaque: Hypertension artérielle</p>
Quand alerter l'équipe médicale ?	
<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p>Symptômes évocateurs d'une hypertension</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges • Augmentation des chiffres lors de la prise de tension <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température > 38.5°C • Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essoufflement, palpitations, douleurs ou oppression thoracique • Gonflement des jambes (oedèmes)
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Infection	<p>Évitez de vous rendre dans des lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée: elle vous protégera.</p>
Suivi de la tension artérielle	<p>Une tension artérielle élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à la faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.</p>
Soins de la peau	<p>Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Évitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</p>
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.</p>
Perte de poids	<p>Surveillez votre poids pendant la durée de traitement : perte de poids possible</p>

