




INAVOLISIB - ITOVEBI®

Qu'est-ce que ITOVEBI

Description de la molécule	Description
Inavolisib	3 mg (Cp pelliculé rouge, rond et convexe, portant l'inscription « INA 3 » gravée sur une face, 6 mm) 9 mg (Cp pelliculé rose, ovale, portant l'inscription « INA 9 » gravée sur une face. 13 mm/L6 mm) 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit comprimé(s) de mg, à prendre 1 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper ni croquer les comprimés.

A prendre à heure fixe. Pendant ou en dehors du repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 9 heures. En revanche, en cas de vomissements, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour - à heure fixe - pendant ou en dehors des repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie hospitalière.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (: prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre glycémie, vos électrolytes, fonctions hépatique et rénale.) et clinique (Surveiller les signes d'hyperglycémie, par exemple : soit excessive, mictions plus fréquentes, vision trouble, confusion mentale, difficultés à respirer ou augmentation de l'appétit avec perte de poids. Contacter un professionnel de santé si ces symptômes surviennent.) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à une semaine après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ITOVEBI® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables les plus fréquents	
Les plus fréquents	<p>Hyperglycémie Troubles digestifs : bouche enflammée (aphtes), diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales Troubles cutanés : éruptions cutanées, démangeaisons Anomalie du bilan biologique : baisse de l'hémoglobine (anémie) et des plaquettes (thrombopénie), augmentation de votre glycémie. Risque d'infection Autres : Fatigue, perte de poids, maux de tête, sécheresse des yeux</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques.	<p>Symptômes évocateurs d'une hyperglycémie : soif excessive, urines plus fréquentes, vision trouble, confusion mentale, difficultés à respirer ou augmentation de l'appétit avec perte de poids. Troubles digestifs : > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. Troubles cutanés : Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau Symptômes évocateurs d'une infection : > Température > 38,5 °C > Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre Suspicion de grossesse : > Chez les femmes traitées > Chez la partenaire pour les hommes traités</p>
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Hygiène dentaire	Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Évitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Soins de la peau	Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Évitez toute utilisation de produits irritants. Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.
Hyperglycémie	Privilégier une alimentation pauvre en glucides. Boire 1.5L par jour. Pratiquer une activité physique régulière.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	



Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Bouche enflammée, aphtes	Evitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

