



## BICALUTAMIDE - CASODEX®

### Qu'est-ce que CASODEX

Description de la molécule	Description
Bicalutamide	<p>Comprimé de 50 mg, rond, blanc            Des génériques de différentes formes existent</p> 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.



Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s), à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés

A prendre A heure fixe. Pendant ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 12 heures. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre fonction hépatique et votre potassium) et clinique (électrocardiogramme) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CASODEX® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Orange de Séville, Passiflore, Pissenlit avec le CASODEX®



## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : perte d'appétit, douleurs abdominales, constipation, nausées, vomissements</p> <p><b>Bouffées de chaleur</b></p> <p>Sensibilité et gonflement des <b>seins</b></p> <p>Baisse de la <b>libido</b></p> <p><b>Anomalie du bilan</b> : anémie (baisse de l'hémoglobine dans le sang), sang dans les urines</p> <p><b>Fatigue</b></p> <p><b>Œdèmes</b> (gonflement des jambes), prise de poids</p> <p><b>Troubles neurologiques</b> : vertiges, somnolence, dépression</p> <p><b>Éruption cutanée</b></p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Symptômes d'un trouble au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Douleurs intenses dans le ventre</b></p> <p><b>Sang dans les urines</b></p> <p><b>Symptômes d'une allergie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démangeaisons avec éruption</li> <li>• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge, entraînant des difficultés pour avaler ou respirer</li> </ul> <p><b>Symptômes d'un trouble de la fonction hépatique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaunisse</li> </ul> <p><b>Symptômes d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique</li> </ul> <p><b>Troubles de la libido</b></p> <p><b>Symptômes d'une dépression</b></p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Bouffées de chaleur	<p><b>Pratiquez</b> une activité physique adaptée.</p> <p><b>Évitez</b> les sources de chaleur.</p>
Soins de la peau	<p><b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p><b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil, <b>utilisez</b> un écran total et <b>évit</b>ez les expositions.</i></p>
Fatigue	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p><b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
Œdèmes (gonflement des jambes)	<p><b>Évitez</b> les vêtements, chaussettes, et chaussures trop serrés.</p> <p><b>Surélevez</b> vos pieds. <b>Surveillez</b> votre poids en cas d'œdème.</p>
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Bouffées de chaleur	<p><b>Évitez</b> la consommation d'aliments épicés, avec de l'alcool ou de la caféine.</p> <p><b>Buvez</b> des boissons froides et de façon abondante.</p>
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés.</p>



Œdèmes

Privilégiez une alimentation pauvre en sel.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la <sup>3/3</sup> licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>