


CABOZANTINIB - CABOMETYX®

Qu'est-ce que CABOMETYX

Description de la molécule	Description
Cabozantinib	Comprimé de 20 mg : rond, jaune Comprimé de 40 mg : triangulaire, jaune Comprimé de 60 mg : ovale, jaune 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.













Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit comprimé de mg à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe. A prendre à distance des repas : 1h avant ou 2h après le repas

En cas d'oubli : prendre la dose si retard 12 h En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, en dehors des repas									
En continu	 J1	 J2	 J3	 J4	 J5	 J6	 J7		 J28

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine (NFS), vos fonctions hépatique, rénale, pancréatique et thyroïdienne, votre glycémie, vos lipides. Bandelettes pour rechercher des protéines dans vos urines.) et clinique (tension artérielle, électro-cardiogramme) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CABOMETYX® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : **Ne pas consommer de Millpertuis** et éviter la consommation de pamplemousse avec le CABOMETYX

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : diarrhée, nausées, perte d'appétit, modification du goût, bouche enflammée (aphtes), vomissements, perte de poids, constipation, remontées acides.</p> <p>Troubles cutanés : inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement (syndrome main/pied)</p> <p>Anomalies du bilan sanguin : baisse des plaquettes (thrombopénie), ou de l'hémoglobine (anémie), troubles de la fonction hépatique, ou de la thyroïde, baisse du potassium ou du magnésium</p> <p>Autres : hypertension, fatigue, saignements, gonflement des membres, toux, modification de la voix</p>
Certains effets nécessitent une attention particulière	hyper ou hypoglycémie chez les <i>patients diabétiques</i>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Symptômes d'une hypertension</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges > Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension <p>Symptômes d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> > Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique <p>Symptômes d'une hémorragie ou d'une phlébite</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sang dans les selles, ou en cas de vomissements > Hématomes (bleus), saignements de nez > Mollet rouge, chaud et douloureux <p>Symptômes d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> > Température > 38,5 °C <p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale > Douleur intense dans le ventre > Ecoulement, abcès ou douleurs au niveau de l'anus <p>Symptôme d'un trouble de la glycémie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Hyperglycémie : envie importante et fréquente de boire, de manger et d'uriner associée à une fatigue > Hypoglycémie : vertiges, nausées, vision trouble, faiblesse musculaire <p>Symptômes évocateurs d'un œdème cérébral</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête, confusion, convulsions ou troubles de la vision
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera.
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Hygiène dentaire	Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Évitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool



Soins de la peau	<p>Sur vos mains et vos pieds : Appliquez une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement).</p> <p>Évitez d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude).</p> <p>Évitez les activités qui génèrent des frottements ou des plaies. Évitez le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées</p> <p>Corps : Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Évitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et évitez les expositions.</p>
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p>Alternez période d'activité et de repos.</p>
Gonflement des membres (œdèmes)	<p>Évitez les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés,</p> <p>Surélevez vos pieds.</p>
Poids	<p>Surveillez régulièrement votre poids en cas de gonflement des membres, ou de troubles digestifs.</p>
Comment adapter votre alimentation?	
Diarrhée	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante</p>
Nausées	<p>Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p>Limitez les aliments gras, frits et épicés</p>
Perte d'appétit	<p>Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »</p>
Bouche enflammée (aphtes)	<p>Évitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.</p>
Altération du goût	<p>Favorisez une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour.</p> <p>Évitez les ustensiles de cuisine métallique.</p>