




ABIRATERONE - ZYTIGA®

Qu'est-ce que ZYTIGA

Description de la molécule	Description
Acétate d'Abiratéronne, Hormonothérapie de nouvelle génération.	Comprimé de 250 mg : blanc, ovale Comprimé de 500 mg : violet, ovale 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.



Dans votre cas, elle est de..... mg / jour soit comprimé(s) / jour, à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés

A prendre A heure fixe. A distance du repas de votre choix (1 heure avant le repas ou 2 heures après le repas).

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, en dehors des repas (1 heure avant, 2 heures après)	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre fonction hépatique, votre potassium, vos triglycérides et votre glucose) et clinique (tension artérielle, électrocardiogramme, densité osseuse par ostéo-densitométrie) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ZYTIGA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Orange de Séville, Passiflore, Pissenlit avec le ZYTIGA®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles au niveau cardiaque : hypertension artérielle</p> <p>Troubles au niveau hépatique</p> <p>Troubles généraux : Rétention d'eau, œdèmes</p> <p>Infections urinaires</p> <p>Anomalies du bilan sanguin : baisse du potassium ou augmentation des triglycérides</p> <p>Troubles digestifs : diarrhées</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	<p>Hyperglycémie pour les <i>patients diabétiques</i></p> <p>Patients ayant de maladies antécédents cardiovasculaires</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Symptômes évocateurs d'une hypertension</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges • Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température > 38,5°C • Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique • Gonflement des jambes (œdèmes) <p>Autres</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de prise de poids trop rapide ou inattendue (œdèmes) • Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour • Coloration de vos urines (sang dans vos urines) • Douleurs musculaires inexplicables
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	<p>Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera</p>
Suivi de la tension	<p>Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.</p>
Soins de la peau	<p>Privilégiez pour <i>la toilette</i> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Evitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p>Pour <i>se protéger du soleil</i>, utilisez un écran total et évitez les expositions.</p>
Œdèmes	<p>Evitez les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés.</p> <p>Surélevez vos pieds. Surveillez régulièrement votre poids.</p>
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Diarrhée	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante</p>



Œdèmes

Privilégiez une alimentation pauvre en sel



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la ^{3/3} licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>