



CRIZOTINIB - XALKORI®

Qu'est-ce que XALKORI

Description de la molécule	Description
Crizotinib	Gélule de 200 mg, blanche et rose Gélule de 250 mg, rose 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit 1 gélule de mg, à prendre en 2 fois par jour, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules.

A prendre A heure fixe, au moment ou en dehors d'un repas

En cas d'oubli : prendre la dose si retard 6h En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville ou hospitalière, en fonction de l'indication.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et rénale, votre potassium, calcium et magnésium) et clinique (tension artérielle, fréquence cardiaque, électrocardiogramme,).

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre XALKORI® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de jus de pamplemousse, Millepertuis, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Orange de Séville, Passiflore, Pissenlit avec le XALKORI®



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles de la vision</p> <p>Troubles digestifs : nausées, diarrhée, vomissement, constipation, perte d'appétit, douleurs abdominales, troubles du goût</p> <p>Généraux : fatigue, étourdissements, baisse de la fréquence cardiaque, gonflements ou œdèmes (visage, jambes, bras)</p> <p>Bilan biologique : baisse de l'hémoglobine (anémie) et/ou des globules blancs (neutropénie), anomalies du bilan hépatique</p> <p>Autres : neuropathies (fourmillements, troubles de la sensibilité), rash cutané</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. > Moins de 3 selles par semaine <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> > Température > 38,5 °C > Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> > Perte de connaissance, palpitations > Essoufflement, manque d'énergie, vertiges <p>Troubles au niveau des yeux</p> <ul style="list-style-type: none"> > Baisse de la vision <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire
Comment prévenir les effets indésirables?	
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou d'œdèmes
Constipation	Pour stimuler le transit, pratiquez une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Infection	Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera.
Soins de la peau	Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Évitez toute utilisation de produits irritants. <i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et évitez les expositions.
Œdèmes	Évitez les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés, Surélevez vos pieds.
Comment adapter son alimentation?	
Nausée	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés



Diarrhée	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante</p>
Constipation	<p>Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.</p>
Troubles du goût	<p>Favorisez une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour.</p> <p>Évitez les ustensiles de cuisine métallique.</p>
Perte de poids	<p>Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »</p>

