



CYPROTERONE ACETATE - ANDROCUR®

Qu'est-ce que ANDROCUR

Description de la molécule	Description
Cyprotérone	Comprimé de 50 mg : blanc, rond Comprimé de 100 mg Des génériques de différentes formes existent

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg par jour, soit comprimé(s) de 50 mg et comprimé(s) de 100 mg, à prendre 2 ou 3 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, Les comprimés pouvant être écrasés ou coupés si besoin.

A prendre à heure fixe, au moment ou en dehors des repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 à 3 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (Prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et votre glycémie) et clinique (Prise de poids) .

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ANDROCUR® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis avec ANDROCUR®



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles généraux : fatigue, transpiration, bouffées de chaleur</p> <p>Comportement : agitation, troubles du sommeil</p> <p>Troubles digestifs : prise de poids ou perte de poids</p> <p>Neurologique : maux de tête</p> <p>Troubles au niveau des yeux : troubles de la vision</p> <p>Sensibilité et gonflement des seins</p> <p>Baisse de la libido</p>
Certains patients nécessitent une surveillance particulière	Patients diabétiques : risque d'hyperglycémie
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles au niveau des yeux</p> <p>> Douleurs à l'œil, larmolement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière</p> <p>Symptômes évocateurs d'une phlébite</p> <p>> Mollet rouge, chaud et douloureux</p> <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p> <p>> Maux de tête</p> <p>Symptômes évocateurs d'une dépression</p> <p>> Idées dépressives</p> <p>> Insomnies</p> <p>> Perte de mémoire</p> <p>Symptômes d'un trouble de la fonction hépatique</p> <p>> Jaunisse</p> <p>Troubles de la libido</p>
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Poids	Surveillez régulièrement votre poids
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p>Alternez période d'activité et de repos.</p>
Bouffées de chaleur	<p>Pratiquez une activité physique adaptée.</p> <p>Évitez les sources de chaleur</p>
Comment adapter son alimentation ?	
Prise de poids	<p>Buvez de façon abondante et évitez les boissons sucrées.</p> <p>Favorisez une alimentation diversifiée : plus de légumes et des fruits, des viandes moins grasses (vollailes sans peau, lapin).</p> <p>Prévoyez une collation pour éviter les grignotages.</p> <p>Évitez les charcuteries, viennoiserie et sucreries diverses, fritures et les produits industriels gras et sucrés.</p>
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir ».



Bouffées de chaleur

Evitez la consommation d'aliments épicés, avec de l'alcool ou de la caféine.

Buvez des boissons froides et de façon abondante



ONCOLIEN de [SFPO](https://oncolien.sfpo.com) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>