



DASATINIB - SPRYCEL®

Qu'est-ce que SPRYCEL

Description de la molécule	Description
Dasatinib	Comprimé de 20 mg : blanc, rond Comprimé de 50 mg : blanc, ovale Comprimé de 70 mg : blanc, rond Comprimé de 80 mg : blanc, ovale Comprimé de 100 mg : blanc, ovale Comprimé de 140 mg : blanc, rond Solution buvable à 10 mg/mL



Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg / jour soit comprimé(s) de 20 mg ou comprimé(s) de 50 mg ou comprimé(s) de 70 mg ou comprimé(s) de 100 mg ou comprimé(s) de 140 mg, à prendre une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	
En continu	J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 ... J28

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos électrolytes, vos fonctions hépatique et rénale) et clinique (tension artérielle).

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la ^{1/3} licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

La survenue d'interactions entre SPRYCEL® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec SPRYCEL®.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs gastriques</p> <p>Troubles de la numération de la formule sanguine : baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie)</p> <p>Troubles généraux : gonflements des membres et/ou du visage, rétention d'eau</p> <p>Douleurs : crampes, douleurs dans les muscles, maux de tête</p> <p>Troubles cutanés : éruptions cutanées, démangeaisons, modification de la texture ou couleur des cheveux (chute possible)</p> <p>Troubles au niveau cardiaque : battements de cœur forts, rapides ou irréguliers</p> <p>Troubles au niveau des poumons</p> <p>Saignements, fatigue</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	Patients porteurs du virus de l'hépatite B
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> > Température > 38,5 °C > Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sang dans les selles, ou en cas de vomissements > Hématomes (bleus), saignements de nez <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête et/ou douleurs articulaires <p>Symptômes évocateurs d'une rétention d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> > Augmentation rapide et inattendue de votre poids <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque ou vasculaire</p> <ul style="list-style-type: none"> > Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges > Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension > Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique
Comment prévenir les effets indésirables?	
Soins de la peau	Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Evitez toute utilisation de produits irritants. Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou de rétention d'eau.
Rétention d'eau	Evitez les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés. Surélevez vos pieds.



Infection	Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera.
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Chute des cheveux	Utilisez un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. Privilégiez une brosse souple. Evitez de laver vos cheveux trop fréquemment. Evitez les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.
Saignements	Evitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...). Informez votre médecin: > si vous consommez <i>des anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires</i> , une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Fatigue / douleurs	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Rétention d'eau	Privilégiez une alimentation pauvre en sel.

