SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE ONCOLIEN®

Fiche patient

# ENASIDENIB - IDHIFA®

## Qu'est-ce que IDHIFA

| Description de la molécule | Description |
|---|---|
| énasidenib | Comprimés dosés à 100mg et 50mg |

## Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de ..... mg à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés

A prendre à heure fixe. Pendant ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 12 heures. En cas de vomissement immédiatement après la prise : prendre une nouvelle dose

## Posologie - Mode d'administration

| | |
|---|---|
| Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas | |
| En continu | |

## Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie hospitalière.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine (NFS), vos fonctions hépatique et rénale et votre taux de potassium, acide urique, phosphore et calcium) et clinique.) et clinique .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre IDHIFA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles,



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Société Française de Pharmacie Oncologique

compléments alimentaires, etc) que vous consommez.
Exemple : Évitez la consommation de jus de pamplemousse, Millepertuis, Levure de riz rouge avec l'Idhifa®.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

| **Effets indésirables** | |
|---|---|
| Les plus fréquents | **Troubles digestifs** : diarrhées, nausées, vomissements, perte d'appétit, troubles ou perte du goût<br>**Anomalies du bilan sanguin** : augmentation des leucocytes (leucocytose), de la bilirubine (hyperbilirubinémie), diminution du calcium, potassium et du phosphore (hypocalcémie, hypokaliémie et hypophosphorémie)<br>**Syndrome de lyse tumorale** : augmentation du potassium, phosphore et de l'urée (hyperkaliémie, hyperphosphatémie, hyperuricémie). Baisse du calcium (hypocalcémie). |
| **Quand alerter l'équipe médicale ?** | |
| Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques. | **Troubles digestifs**<br>• En cas de perte de poids importante et/ou rapide<br>• Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour<br>• Douleur intense dans le ventre<br>**Symptômes évocateurs d'une augmentation des globules blancs :**<br>• Essoufflement, fièvre, ganglions<br>• Douleurs osseuses<br>• Prise de poids rapide, insuffisance rénale<br>**Symptômes évocateurs d'un syndrome de lyse tumoral**<br>• Coloration de vos urines<br>• Diminution de la quantité d'urine éliminée<br>• Douleur sur un côté en dessous des côtes |
| **Comment prévenir les effets indésirables?** | |
| Poids | **Surveillez** régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs |
| **Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants?** | |
| Diarrhées | **Privilégiez** une alimentation pauvre en fibres. **Consommez** de préférence des féculents, des carottes, des bananes. **Evitez** de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. **Buvez** de l'eau de façon abondante si possible 2 litres par jour |
| Nausées | **Privilégiez** une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.<br>**Limitez** les aliments gras, frits et épicés |
| Perte d'appétit | **Privilégiez** une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir » |
| Troubles du goût | **Favorisez** une alimentation tiède ou froid en plusieurs petits repas par jour.<br>**Evitez** les ustensiles de cuisine métalliques. |


ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com