


ACALABRUTINIB - CALQUENCE®

Qu'est-ce que CALQUENCE

Description de la molécule	Description
acalabrutinib	Comprimés de 100 mg : rose 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit comprimé(s) de 100 mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans mâcher, écraser, dissoudre ou diviser les comprimés

A prendre A heure fixe. Pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 3 heures. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Deux prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller la numération de la formule sanguine) et clinique (électrocardiogramme, suivi dermatologique) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs, pilule contraceptive et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CALQUENCE® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Évitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec CALQUENCE®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Infections : fièvre, infections pulmonaires (pharyngite, laryngite, sinusite, rhinite, pneumonie, etc)</p> <p>Douleurs : maux de tête, articulations, muscles, spasmes musculaires</p> <p>Troubles digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, constipation, bouche enflammée (aphtes), perte d'appétit</p> <p>Troubles vasculaires : saignements inhabituels, taches sur la peau, hématomes, hypertension</p> <p>Troubles généraux : fatigue, gonflement des jambes et/ou des bras, vertiges</p> <p>Troubles cutanés : éruption cutanée</p> <p>Anomalies du bilan biologique : baisse des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), de l'hémoglobine (anémie) et/ou des plaquettes (thrombopénie)</p> <p>Troubles au niveau cardiaque</p>
Patients nécessitant une surveillance particulière	<ul style="list-style-type: none"> • Patients ayant un trouble de la fonction cardiaque • Patients ayant un antécédent d'hépatite B
Quand alerter l'équipe médicale?	



<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température > 38,5 °C • Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de perte de poids importante et/ou rapide • Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour • Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale • Douleur intense dans le ventre • Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. • Moins de 3 selles par semaine <p>Aggravation d'un trouble cutané :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs ou inflammation aux mains et aux pieds <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sang dans les selles, ou en cas de vomissements • Hématomes (bleus), saignements de nez <p>Symptômes évocateurs d'un œdème cérébral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête, confusion, convulsions • Troubles de la vision <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête • Douleurs articulaires <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique • Troubles cutanés <ul style="list-style-type: none"> ◦ Apparition de verrues ◦ Peau douloureuse ou bosse rougeâtre sur la peau accompagnée de saignements ou ne cicatrisant pas ◦ Changement de taille ou de couleur d'un grain de beauté
<p>Comment prévenir les effets indésirables?</p>	
<p>Infection</p>	<p>Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera</p>
<p>Soins de la peau</p>	<p><u>Sur vos mains et vos pieds</u> : Appliquez une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement).</p> <p>Évitez d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude). Évitez les activités qui génèrent des frottements ou des plaies et le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées</p> <p><u>Corps</u> : Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Évitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</i></p>
<p>Poids</p>	<p>Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou d'œdèmes (gonflement des jambes et/ou bras)</p>



Saignements, hémorragies	<p>Evitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...).</p> <p>Informez votre médecin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose • en cas d'<i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Hygiène dentaire	<p>Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium.</p> <p>Evitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool.</p>
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...</p> <p>Alternez période d'activité et de repos.</p>
Œdèmes	Evitez les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés. Surélevez vos pieds.
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Comment adapter son alimentation?	
Diarrhées	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante</p>
Constipation	<p>Privilégiez une alimentation enrichie en fibres.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante.</p>
Nausées	<p>Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p>Limitez les aliments gras, frits et épicés</p>
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Bouche enflammée (aphtes)	Evitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.
Œdèmes	Privilégiez une alimentation pauvre en sel.

