




## ETOPOSIDE - CELLTOP®

### Qu'est-ce que CELLTOP

Description de la molécule	Description
Etoposide	Capsule molle de 25 mg Capsule molle de 50 mg 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... capsules de 25 mg et ..... capsules de 50 mg, à prendre ..... fois / jour.







Un cycle dure ..... semaines, le CELLTOP® doit être pris pendant ..... jours consécutifs puis arrêté ..... jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les capsules

A prendre à heure fixe au moment ou en dehors des repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

2 ou 3 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	  
Prise de 21 jours consécutifs tous les 28 jours (7 jours d'arrêt)	
Prise de 3 à 5 jours tous les 28 jours	
Prise de 3 à 5 jours tous les 21 jours	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller la numération de la formule sanguine avant chaque début de cycle et votre fonction rénale) et clinique (tension



artérielle) .

### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre CELLTOP® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation d'Olivier avec le CELLTOP®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Anomalie du bilan biologique</b> : baisse de l'hémoglobine (anémie), des globules blancs (leucopénie), des polynucléaires neutrophiles (neutropénie) et des plaquettes (thrombopénie), anomalie du bilan hépatique</p> <p><b>Troubles digestifs</b> : douleurs abdominales, perte de poids, constipation, nausées, vomissements, diarrhée, bouche enflammée (aphtes)</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : perte des cheveux, démangeaisons, éruption cutanée, pigmentation de la peau</p> <p><b>Autres</b>: fatigue, malaise, vertiges</p> <p><b>Troubles de la fonction cardiaque, hypertension</b></p>
Certains nécessitent une attention particulière	Patients intolérants au fructose
Quand alerter l'équipe médicale?	
<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> <li>&gt; Moins de 3 selles par semaine</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>&gt; hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>&gt; Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un syndrome de lyse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Coloration de vos urines,</li> <li>&gt; Diminution de la quantité d'urine éliminée</li> <li>&gt; Douleur sur un côté en dessous des côtes</li> </ul> <p><b>Troubles cutanés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables?	



Infection	<b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). <b>Une vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.
Hygiène dentaire	<b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, <b>réalisez</b> des bains de bouche au bicarbonate de sodium. <b>Evitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool.
Saignements, hémorragie	<b>Evitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) <b>Informez</b> votre médecin: > si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Chute des cheveux	<b>Faites</b> couper vos cheveux. <b>Informez-vous</b> sur les perruques et leur remboursement. <b>Utilisez</b> un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. <b>Privilégiez</b> une brosse souple. <b>Evitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment. <b>Evitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.
Constipation	Pour stimuler le transit, <b>pratiquez</b> une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...
<b>Comment adapter son alimentation ?</b>	
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Perte de poids	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Diarrhée	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Evitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.