




SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE
ONCOLIEN®

Fiche d'aide à la délivrance de chimiothérapie destinée aux professionnels de santé

ETOPOSIDE - CELLTOP®

Présentation
















Classification médicamenteuse	Dosage	Photographies
Cytotoxique : Inhibiteur de topoisomérase II	25 mg 50 mg	

Indications AMM

- **carcinome embryonnaire du testicule**
- **cancer bronchique à petites cellules**
- **choriocarcinome placentaire**
- **cancer du sein** antérieurement traités
- **lymphome malin hodgkinien et non hodgkinien**
- **leucémie aiguë** (induction, rechute et entretien)

D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées.

Posologie - Mode d'administration

2 ou 3 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas			
Prise de 21 jours consécutifs tous les 28 jours (7 jours d'arrêt)		 J1 ...  J21	 J22 ...  J28
Prise de 3 à 5 jours tous les 28 jours		 J1 ...  J5	 J6 ...  J28
Prise de 3 à 5 jours tous les 21 jours		 J1 ...  J5	 J6 ...  J21

- Posologies :



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

- **80 à 300 mg/m²/ jour** pendant 3 à 5 jours tous les 21 à 28 jours
- **50 à 100 mg/m²/ jour** pendant 21 jours tous les 28 jours
- En cas d'oubli ou de vomissement : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.
- Capsules à **avalier entières** avec un grand verre d'eau, sans être ouvertes, ou dissoutes.
- Capsules à **prendre à heure fixe** au moment ou en dehors des repas.
- Conservation < 25°C, ne pas déconditionner les capsules dans un pilulier.

Conditions de prescription et délivrance

- Disponible en **pharmacie de ville**
- **Prescription hospitalière** réservée à certains médecins spécialistes (en cancérologie, en hématologie, en oncologie médicale)
- Médicament nécessitant une **surveillance particulière** pendant le traitement.

Effets indésirables

Toxicité	Fréquence	Grade	Surveillance/Prévention
Gastro intestinale			
Nausées, vomissements	TRES FREQUENT		Surveillance de la perte de poids. Alimentation i) fragmentée en plusieurs repas légers, ii) liquide et froide et iii) moins grasse, sans friture ou épices. Prescription possible de traitements antiémétiques.
Hématologique			
Leucopénie	TRES FREQUENT		Réversible, non cumulative et dose dépendante Surveillance de la NFS régulière
Thrombopénie	FREQUENT		Réversible, non cumulative et dose dépendante Surveillance de la NFS régulière
Cutanée			
Alopécie	FREQUENT		Inconstante et réversible.
Neurologique			
Paresthésies périphériques	RARE		Supplémentation possible en oligoéléments et vitamines B1/B6. Prescription possible d'antiépileptiques ou d'antidépresseurs.

Populations particulières et recommandations

- **Mécanisme de résistance** :
 - résistance croisée de type MDR avec les anthracyclines et les dérivés de la pervenche
 - Modification qualitative (mutation) et quantitative (diminution de l'expression) de la topoisomérase II
- **Insuffisance hépatique** : métabolisation hépatique mineure, aucune adaptation de la posologie en cas d'insuffisance hépatique .
- **Insuffisance rénale** : métabolisation rénale importante, élimination principalement rénale, adaptation de la posologie en cas d'insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 60 mL/min/1,73m²)
- **Patients âgés** : Aucune adaptation de la posologie chez le sujet âgé.





Bilan biologique

Surveillance NFS, plaquettes, bilan rénal régulier



Grossesse et allaitement

Contraception obligatoire pendant le traitement.
Allaitement contre-indiqué.

Métabolismes et transporteurs

	3A4/5	P-gp
Substrat		
Inducteur		
Inhibiteur		
Voie métabolique majeure / inhibiteur-inducteur puissant		
Voie métabolique mineure / inhibiteur-inducteur modéré		

Interactions médicamenteuses majeures

Avec des médicaments à marge thérapeutique étroite

Anti-vitamines K	Conseil(s) : Augmentation du risque thrombotique et hémorragique, contrôler l'INR
Phénytoïne	Conseil(s) : Risque de perte d'efficacité de l'anticancéreux. Association contre-indiquée en prévention de l'effet convulsivant des anticancéreux. Association à surveiller (surveillance clinique et adaptation posologique de l'anticancéreux) en cas de traitement antiépileptique préalable à l'introduction de l'anticancéreux
Immunosuppresseurs : ciclosporine, tacrolimus	Conseil(s) : Risque d'immunosuppression excessive avec risque de lymphoprolifération

Interaction avec les vaccins

Vaccin contre la fièvre jaune	Conseil(s) : Association contre-indiquée : risque de maladie vaccinale généralisée potentiellement mortelle
Vaccins vivants atténués	Conseil(s) : Association déconseillée : prescription d'un vaccin inactivé lorsqu'il existe



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

Interactions avec la phytothérapie

Certaines plantes et ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. Néanmoins, les niveaux d'interactions dépendront de l'exposition. La quantité consommée, la fréquence, une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel, devront être pris en compte.

Antioxydants : Thé vert, Sélénium, Vitamine C et E (à forte dose), Desmodium

Pouvant favoriser une immunodépression : Olivier



ONCOLIEN de [SFPO](https://www.sfpo.com) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>