




## IDEALISIB - ZYDELIG®

### Qu'est-ce que ZYDELIG

Description de la molécule	Description
Idelalisib	Comprimé de 150 mg ovale, rose comprimé de 100 mg ovale, orange 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.












Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit 1 comprimé de ..... mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe pendant ou en dehors des repas

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 6 heures. En revanche, en cas de vomissements, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	  
En continu	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Disponible en pharmacie de ville

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et votre bilan lipidique) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ZYDELIG® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis.

### Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre**



**médecin ou votre pharmacien.**

Quels sont les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : diarrhée colite</p> <p><b>Anomalies du bilan biologique</b> : baisse des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), anomalies du bilan hépatique et/ou lipidique</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruption cutanée</p> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b> : toux</p> <p><b>Autre</b> : fièvre, infection</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; <b>Toux, douleur de gorge</b>, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Troubles cutanés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateur d'un trouble neurologique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges, étourdissements, troubles de l'humeur, de la mémoire, fourmillements, paralysie des membres, manque de coordination des mouvements</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	<p><b>N'oubliez pas</b> l'antibiotique prescrit par votre médecin.</p> <p><b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera.</p>
Poids	<p><b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.</p>
Soins de la peau	<p><b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Evitez</b> toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil</i>, <b>utilisez</b> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p>
Comment adapter son alimentation?	
Diarrhée	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p><b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>

