


## IMATINIB MESILATE - GLIVEC®

### Qu'est-ce que GLIVEC

Description de la molécule	Description
Imatinib	<p>Comprimé de 100 mg : rond, orange            Comprimé de 400 mg : ovale, orange</p> <p><b>Des génériques de différentes formes existent</b></p> 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg / jour soit ..... comprimé(s) de 100mg et ..... comprimé(s) de 400 mg, à prendre ..... fois par jour, tous les jours



A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser les comprimés.

Si besoin à disperser dans environ un verre d'eau plate ou de jus de pomme (aucun autre liquide ne doit être utilisé) en agitant de temps à autre. La dispersion doit être bue immédiatement. Rincez le verre d'eau et boire.

A prendre à heure fixe, au cours des repas pour éviter des potentielles douleurs gastriques.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 12 heures (si schéma de prise en 1 fois par jour) ou dans les 6 heures (si schéma de prise en 2 fois par jour). En revanche, en cas de vomissements, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

une ou deux prise(s) par jour, à heure fixe, au cours du repas	
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## Quelles sont les autres informations à connaître ?

### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre uricémie et votre fonction hépatique) et clinique (tension artérielle) .

### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre GLIVEC® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Eviter la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec GLIVEC®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs gastriques</p> <p><b>Troubles de la numération de la formule sanguine</b> : baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie)</p> <p><b>Troubles généraux</b> : gonflements des membres et/ou du visage, rétention d'eau, gonflement des membres (œdèmes)</p> <p><b>Douleurs</b> : crampes, douleurs dans les muscles, et/ou les articulations, maux de tête</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, sécheresse cutanée, hypersensibilisation à l'exposition au soleil</p> <p><b>Saignements, fatigue</b></p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	<p>Patients porteurs du virus de l'hépatite B</p> <p>Patients ayant une hypothyroïdie</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	



<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>&gt; Hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête</li> <li>&gt; Douleurs articulaires</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une rétention d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Augmentation rapide et inattendue de votre poids</li> </ul>
<b>Comment prévenir les effets indésirables?</b>	
Soins de la peau	<p><b>Privilégiez</b> pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p><b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.</p> <p>Pour se protéger du soleil, <b>utilisez</b> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p>
Poids	<p><b>Surveillez</b> régulièrement <b>votre poids</b> en cas de troubles digestifs ou de rétention d'eau</p>
Rétention d'eau (gonflement des bras et jambes)	<p><b>Évitez</b> les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés, <b>Surélevez</b> vos pieds.</p>
Infection	<p><b>Évitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera</p>
Douleurs articulaires	<p><b>Pratiquez</b> une activité physique adaptée</p>
Saignements	<p><b>Évitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...)</p> <p><b>Informez</b> votre médecin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; si vous consommez des <i>anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose</li> <li>&gt; en cas d'<i>intervention chirurgicale ou dentaire</i></li> </ul>
Fatigue	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p><b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
<b>Comment adapter son alimentation?</b>	
Diarrhées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p><b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>



Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Rétention d'eau	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en sel



ONCOLIEN de [SFPO](https://oncolien.sfpo.com) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>