SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE ONCOLIEN®

Fiche patient

LAPATINIB - TYVERB®

Qu'est-ce que TYVERB

Description de la molécule	Description
Lapatinib	Comprimé de 250 mg : marron, ovale

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de 250 mg, à prendre 1 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe. A distance du repas (1 heure avant ou 1 heure après un repas)

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, en dehors du repas	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et votre potassium) et clinique (tension artérielle, électro-cardiogramme, scintigraphie cardiaque) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre TYVERB® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou jus de pamplemousse avec TYVERB®

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	**Troubles digestifs :** diarrhées, nausées, vomissements, perte d'appétit et de poids **Troubles cutanés :** sécheresse, boutons (acné), inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement (surtout si associé à la capécitabine), modifications des ongles, sensibilité en cas d'exposition au soleil **Douleurs :** au niveau des articulations et des extrémités, maux de tête **Anomalies du bilan biologique :** troubles de la fonction hépatique **Troubles de la fonction cardiaque** **Autres :** toux, fatigue, bouffées de chaleur
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	**Troubles digestifs** > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. **Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque** > Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique **Troubles cutanés** > Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau > Aggravation de douleurs ou inflammation aux mains et aux pieds **Troubles au niveau des poumons** > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire **Douleurs empêchant vos activités habituelles** > Maux de tête > Douleurs articulaires
Comment prévenir les effets indésirables?	
Poids	**Surveillez** régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Fatigue	**Privilégiez** des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... **Alternez** période d'activité et de repos.
Soins de la peau	*Sur vos mains et vos pieds :* **Appliquez** une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement). **Evitez** d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude). **Evitez** les activités qui génèrent des frottements ou des plaies et le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées *Corps :* **Privilégiez** *pour la toilette* un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. *Evitez* toute utilisation de produits irritants. *Pour se protéger du soleil,* **utilisez** un écran total. **Evitez** les expositions.
Soins des ongles	**Evitez** les traumatismes de vos ongles des mains et des pieds. **Evitez** les vernis sauf si c'est un vernis (protecteur) qui vous a été conseillé spécifiquement par l'équipe soignante. **Privilégiez** une coupe des ongles droits et pas trop courts.
Bouffées de chaleur	**Pratiquez** une activité physique adaptée. **Evitez** les sources de chaleur
Douleurs articulaires	**Pratiquez** une activité physique adaptée
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Société Française de Pharmacie Oncologique

Diarrhées	**Privilégiez** une alimentation pauvre en fibres. **Consommez** de préférence des féculents, des carottes, des bananes. **Evitez** de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. **Buvez** de l'eau de façon abondante
Nausées	**Privilégiez** une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. **Limitez** les aliments gras, frits et épicés
Bouffées de chaleur	**Evitez** la consommation d'aliments épicés,avec de l'alcool ou de la caféine. **Buvez** des boissons froides et de façon abondante

ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com