



## LAROTRECTINIB - VITRAKVI®

### Qu'est-ce que VITRAKVI

Description de la molécule	Description
Larotrectinib	Gélule de 25mg: blanche, opaque (18 mm de long x 6 mm de large) Gélule de 100mg : blanche, opaque (22 mm de long x 7 mm de large) Solution buvable : incolore à jaune ou orange ou rouge ou brunâtre, flacon de 50mL

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de.....mg/jour, soit ..... gélule(s) de .....mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

Dans votre cas, elle est de .....mg/jour, soit ..... mL à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, avaler la gélule en entier. Ne pas l'ouvrir.

A prendre à heure fixe, pendant ou en dehors du repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Deux prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas			
En continu			

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre VITRAKVI® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments



alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Eviter la consommation de Pamplermousse et millepertuis

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Anomalies du bilan sanguin :</b> baisse de l'hémoglobine (anémie), baisse des plaquettes (Thrombopénie), baisse des Polynucléaires neutrophiles (Neutropénie)</p> <p><b>Troubles digestifs :</b> constipation, nausées, diarrhées, troubles du goût, augmentation du poids</p> <p><b>Douleurs :</b> muscles (myalgies)</p> <p><b>Anomalies du bilan biologique :</b> perturbation bilan hépatique (ASAT, ALAT)</p> <p><b>Autres:</b> vertiges, troubles de la marche</p>
Quand alerter l'équipe médicale ?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Symptômes d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température &gt; 38,5 °C</li> <li>• Toux, douleur à la gorge, douleur pour uriner</li> </ul> <p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>• Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>• Impossibilité de boire pendant 24h et/ou de manger pendant environ 48h</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Infection	<b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Diarrhées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des varottes, des bananes.</p> <p><b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.</p>
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides ou froids.</p> <p><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés.</p>
Troubles du goût	<p><b>Favorisez</b> une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour.</p> <p><b>Evitez</b> les ustensiles de cuisine métalliques.</p>

