

## ALECTINIB - ALECENSA®

### Qu'est-ce que ALECENSA

Description de la molécule	Description
Alectinib	Gélule de 150 mg : blanche 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... gélule(s) de 150 mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir, mâcher ou dissoudre les gélules.

A prendre A heure fixe, pendant les repas.

en cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 6 heures. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, au cours des repas	  
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et vos CPK) et clinique (tension artérielle, électrocardiogramme).

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ALECENSA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Évitez la consommation de jus de pamplemousse, Millepertuis, Levure de riz rouge avec l'ALECENSA®

### Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : constipation, nausées, diarrhées, douleurs abdominales, bouche enflammée (stomatite), troubles du goût, augmentation du poids</p> <p><b>Douleurs</b> : muscles (myalgies)</p> <p><b>Œdèmes</b> : gonflement des membres</p> <p><b>Anomalies du bilan biologique</b> : élévation de vos CPK, baisse de l'hémoglobine (anémie), anomalies du bilan hépatique</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : sensibilité au soleil, éruptions</p> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b> : vision trouble, baisse de la vision</p> <p><b>Troubles au niveau du cœur</b></p> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <p>En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale Douleur intense dans le ventre Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. Moins de 3 selles par semaine</p> <p><b>Troubles musculaires</b></p> <p>Douleurs inhabituelles et inexplicables dans les muscles</p> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <p>Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'un ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie)</b></p> <p>Perte de connaissance, vertiges Chute de la tension artérielle</p> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b></p> <p>Douleurs à l'œil, larmolement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou de gonflement des membres (œdèmes)
Soins de la peau	<b>Privilégiez</b> pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants. Pour se protéger du soleil, <b>utilisez</b> un écran total et évitez les expositions.
Hygiène dentaire	<b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, <b>réalisez</b> des bains de bouche au bicarbonate de sodium. <b>Évitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Yeux	<b>Évitez</b> le port de lentilles de contact. <b>Évitez</b> de conduire en cas de faible luminosité
Œdèmes	<b>Évitez</b> les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés. <b>Surélevez</b> vos pieds. <b>Surveillez</b> régulièrement votre poids.
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.



Comment adapter votre alimentation ?	
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Trouble du goût	<b>Favorisez</b> une alimentation tiède ou froid en plusieurs petits repas par jour. <b>Évitez</b> les ustensiles de cuisine métallique.
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Évitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.
Œdèmes	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en sel

