

Fiche patient



LENVATINIB - LENVIMA / KISPLYX®

Qu'est-ce que LENVIMA / KISPLYX

Description de la molécule	Description	
	Gélule de 10mg : bicolore jaune/rouge orangé Gélule de 4 mg : rouge orangé	
Lenvatinib		

Comment prendre votre traitement?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de...... gélules de 10 mg et de gélules de 4 mg à prendre en une seule prise par jour, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans être ouvertes ou dissoutes

A prendre à heure fixe, au moment ou en dehors du repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 12 heures. En revanche en cas de vomissement, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	6	101	101
En continu	⊘ ⊘ ⊘ ⊘) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	J3 J4 J5 J6	2 2 J28

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre fonction rénale, votre fonction hépatique et votre thyroïde, dosage des protéines dans les urines) et clinique (Tension artérielle, électro-cardiogramme) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre LENVIMA / KISPLYX[®] et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions

Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.

Exemple : Evitez la consommation de Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Passiflore avec le LENVIMA ®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables				
Les plus fréquents	Troubles au niveau cardiaque: hypertension Troubles digestifs: diarrhée, diminution de l'appétit, perte de poids, nausées, vomissements, bouche enflammée (aphtes) Troubles cutanés: inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement Troubles au niveau des muscles: douleurs articulaires, musculaires, mal de dos Autres: fatigue, altération de la voix, maux de tête, hémorragies, saignements Anomalie du bilan: protéinurie (présence de protéines dans les urines), troubles au niveau de la thyroïde			
Quand alerter l'équipe médicale?				
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	 Symptômes évocateurs d'une hypertension Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension Troubles digestifs En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale Douleur intense dans le ventre Écoulement, abcès, ou douleurs au niveau de l'anus Symptômes évocateurs de troubles cardiaques Essoufflement inhabituel, palpitations ou douleurs ou oppression thoracique Faiblesse sur un côté du corps, maux de tête intenses, convulsions, confusion, difficultés pour parler, modifications de la vision ou vertiges importants Symptômes évocateurs d'une hémorragie Sang dans les selles, ou en cas de vomissements Hématomes (bleus), saignements de nez Douleurs empêchant vos activités habituelles Maux de tête Douleurs articulaires Douleurs ou inflammation des mains ou des pieds 			
Comment prévenir les effets indésirables ?				
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.			
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs			
Hygiène dentaire	Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Evitez les bains de bouche contenant du menthol ou de alcool			
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport			



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Alternez période d'activité et de repos.

Soins de la peau : mains/pieds	Appliquez une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement). Evitez d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude). Evitez les activités qui génèrent des frottements ou des plaies. Evitez le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées.	
Saignements, hémorragies	 Evitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine) Informez votre médecin: si vous consommez des anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires : une surveillance étroite s'impose en cas d'intervention chirurgicale ou dentaire 	
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants?		
Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Il convient d'éviter de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante	
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une "alimentation plaisir"	
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés.	
Bouche enflammée (aphtes)	Evitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.	