




## LENVATINIB - LENVIMA / KISPLYX®

### Qu'est-ce que LENVIMA / KISPLYX

Description de la molécule	Description
Lenvatinib	Gélule de 10mg : bicolore jaune/rouge orangé Gélule de 4 mg : rouge orangé 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.













Dans votre cas, elle est de..... mg/jour soit ..... gélules de 10 mg et de ..... gélules de 4 mg à prendre en une seule prise par jour, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans être ouvertes ou dissoutes

A prendre à heure fixe, au moment ou en dehors du repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 12 heures. En revanche en cas de vomissement, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	  
En continu	        

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre fonction rénale, votre fonction hépatique et votre thyroïde, dosage des protéines dans les urines) et clinique (Tension artérielle, électro-cardiogramme) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre LENVIMA / KISPLYX® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la <sup>1/3</sup> licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Passiflore avec le LENVIMA<sup>®</sup>

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles au niveau cardiaque</b> : hypertension</p> <p><b>Troubles digestifs</b> : diarrhée, diminution de l'appétit, perte de poids, nausées, vomissements, bouche enflammée (aphtes)</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement</p> <p><b>Troubles au niveau des muscles</b> : douleurs articulaires, musculaires, mal de dos</p> <p><b>Autres</b> : fatigue, altération de la voix, maux de tête, hémorragies, saignements</p> <p><b>Anomalie du bilan</b> : protéinurie (présence de protéines dans les urines), troubles au niveau de la thyroïde</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b> Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</p> <p><b>Troubles digestifs</b> En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale Douleur intense dans le ventre Écoulement, abcès, ou douleurs au niveau de l'anus</p> <p><b>Symptômes évocateurs de troubles cardiaques</b> Essoufflement inhabituel, palpitations ou douleurs ou oppression thoracique Faiblesse sur un côté du corps, maux de tête intenses, convulsions, confusion, difficultés pour parler, modifications de la vision ou vertiges importants</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b> Sang dans les selles, ou en cas de vomissements Hématomes (bleus), saignements de nez</p> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b> Maux de tête Douleurs articulaires Douleurs ou inflammation des mains ou des pieds</p>
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Suivi de la tension	<p>Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.</p>
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Hygiène dentaire	<b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. <b>Évitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.



Soins de la peau : mains/pieds	<p><b>Appliquez</b> une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement).</p> <p><b>Évitez</b> d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude).</p> <p><b>Évitez</b> les activités qui génèrent des frottements ou des plaies. <b>Évitez</b> le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées.</p>
Saignements, hémorragies	<p><b>Évitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...)</p> <p>Informez votre médecin:</p> <p>si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose en cas d'<i>intervention chirurgicale ou dentaire</i></p>
<b>Comment adapter votre alimentation ?</b>	
Diarrhées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Il convient d'<b>éviter</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>
Perte de poids	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une "alimentation plaisir"
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.</p> <p><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés.</p>
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Évitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

