




LOMUSTINE - BELUSTINE®

Qu'est-ce que BELUSTINE

Description de la molécule	Description
Lomustine	Gélule de 40 mg : bleue 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.
















Dans votre cas, elle est de..... mg / semaines, soit gélule(s) de 40 mg à prendre en **1 seule prise toutes les semaines.**

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules.

A prendre A heure fixe. A distance du dîner (3h après)

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 24 heures. Avertir votre oncologue. En revanche, en cas de vomissements, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise, à heure fixe, 3 h après le dîner	  
Prise 1 jour toutes les 6 semaines	 J1  J2 ...  J42  J43  J44  J45
	 J1  J2 ...  J21  J22  J23  J24

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie hospitalière

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos fonctions hépatique et rénale) et clinique (tests respiratoires) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre BELUSTINE® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Évitez la consommation d'Olivier avec la BELUSTINE®.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Anomalie du bilan biologique : baisse des globules blancs (leucopénie), baisse des plaquettes (thrombopénie)</p> <p>Troubles digestifs : nausées, vomissements (3 à 6 heures après la prise de BELUSTINE® et jusqu'à 24 heures après la prise)</p> <p>Infertilité chez l'homme et la femme</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	<p>Patients intolérants au lactose</p> <p>Patients ayant une maladie cœliaque</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> > Température > 38,5 °C > Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sang dans les selles, ou en cas de vomissements > Hématomes (bleus), saignements de nez
Comment prévenir les effets indésirables?	
Manipulation d'un médicament anticancéreux	Évitez le contact des gélules avec la peau. Portez des gants, et lavez vos mains après manipulation.
Infertilité	Renseignez-vous auprès de votre médecin avant le début du traitement sur les moyens de conservation des ovocytes et des gamètes
Infection	Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera
Saignements	Évitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) Informez votre médecin: > si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose > en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Hygiène dentaire	Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Évitez les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Comment adapter son alimentation?	
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés

