




## METHOTREXATE - NOVATREX®

### Qu'est-ce que NOVATREX

| Description de la molécule | Description   |
|----------------------------|---|
| Méthotrexate               | Comprimé de 2.5 mg<br>Des génériques de différentes formes existent<br> |

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.









Dans votre cas, elle est de..... mg/semaine, soit ..... comprimé(s), à prendre en **une seule prise, toutes les semaines**

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe, au moment ou en dehors de'un repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

|  |   |
|--|---|
| Une prise par semaine, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas |     |
| J1, reprise à J8   |     <br>J1 J2 ... J7 J8 |

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos fonctions hépatique et rénale) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre NOVATREX® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



Exemple : Evitez la consommation d'Olivier, d'aspirine ou d'anti-inflammatoire avec le méthotrexate. Certains vaccins (vivants) sont contre-indiqués avec le méthotrexate.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

| Effets indésirables  |   |
|--|---|
| Les plus fréquents   | <p><b>Anomalie du bilan biologique</b> : baisse des globules blancs (leucopénie), des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), anomalie du bilan hépatique et rénal</p> <p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissement, diarrhée, douleurs abdominales</p> <p><b>Vertiges</b></p> <p><b>Infertilité</b> réversible à l'arrêt du traitement</p>  |
| Certains patients nécessitent une attention particulière   | <p>Patients porteur du virus de l'hépatite B ou C</p> <p>Patients intolérants au lactose</p>  |
| Quand alerter l'équipe médicale?   |   |
| Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques | <p><b>Troubles digestifs</b></p> <p>En cas de perte de poids importante et/ou rapide</p> <p>Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</p> <p>Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</p> <p>Douleur intense dans le ventre</p> <p>Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <p>Température &gt; 38,5 °C</p> <p>Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <p>Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</p> <p><b>Troubles cutanés</b></p> <p>Apparition de cloques importantes ou un décollement sévère de la peau</p> <p><b>Symptômes évocateur d'un trouble neurologique</b></p> <p>Fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges, étourdissements, troubles de l'humeur, de la mémoire, fourmillements, paralysie des membres, manque de coordination des mouvements</p> |
| Comment prévenir les effets indésirables?  |   |
| Poids  | <b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs  |
| Infection  | <b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera   |
| Manipulation d'un médicament anticancéreux   | <b>Evitez</b> le contact des comprimés avec la peau. Portez des gants, et lavez vos mains après manipulation.   |
| Soins de la peau   | <b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.<br><b>Evitez</b> toute utilisation de produits irritants.<br><i>Pour se protéger du soleil, <b>utilisez</b> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</i>  |
| Soins des cheveux  | <b>Utilisez</b> un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité.<br><b>Privilégiez</b> une brosse souple.<br><b>Evitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment. <b>Evitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.   |
| Comment adapter son alimentation?  |   |



|           |  |
|-----------|--|
| Nausées   | <b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.<br><b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés  |
| Diarrhées | <b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes.<br><b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.<br><b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante |

