




MIDOSTAURINE - RYDAPT®

Qu'est-ce que RYDAPT

Description de la molécule	Description
Midostaurine	Capsule de 25 mg : orange 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.




Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit gélule(s) de 25 mg à prendre 2 fois par jour (préciser si prise en continue ou non)

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules.

A prendre A heure fixe, au cours du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, pendant les repas	  
En continu (monothérapie) ou en discontinu selon le protocole (association)	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre glycémie, votre potassium et votre fonction hépatique) et clinique (électrocardiogramme) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre RYDAPT® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec le RYDAPT®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables les plus fréquents	
Les plus fréquents	<p>Anomalies du bilan biologique : baisse des globules blancs (leucopénie - neutropénie), de l'hémoglobine (anémie), des plaquettes (thrombopénie), hyperglycémie</p> <p>Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, bouche enflammée (aphtes)</p> <p>Troubles cutanés : éruption, sécheresse, réactions au soleil</p> <p>Troubles de la fonction cardiaque dont des hypo- ou hypertensions, gonflement des jambes et/ou des bras (œdèmes)</p> <p>Troubles au niveau des poumons</p> <p>Autres : saignement de nez, maux de tête, douleurs articulaires</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	Patients diabétiques (hyperglycémie)
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de perte de poids importante et/ou rapide • Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour • Douleur intense dans le ventre • Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Température > 38,5 °C • Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête • Douleurs articulaires <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique
Comment prévenir les effets indésirables?	
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou d'œdèmes.
Infection	Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera
Soins de la peau	Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Evitez toute utilisation de produits irritants. <i>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</i>
Suivi de la tension	Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Diarrhées	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes.</p> <p>Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.</p> <p>Buvez de l'eau de façon abondante</p>



Nausées

Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.
Limitez les aliments gras, frits et épicés

