



MITOTANE - LYSODREN®

Qu'est-ce que LYSODREN

Description de la molécule	Description
Mitotane	Comprimé de 500 mg : blanc, sécable

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg par jour, soit comprimés de 500 mg à prendre fois par jour, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A prendre à heure fixe, au cours de repas riches en graisse.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

2 à 3 prises par jour, à heure fixe, pendant les repas (riches en graisse)	
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie hospitalière.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos fonctions hépatique et thyroïdienne, votre cholestérol et vos triglycérides) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre LYSODREN® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.


Exemple : Évitez la consommation de Bardane, Boldo, Bourrache, Ginkgo Biloba, Reine des Prés, Trèfle Rouge avec le LYSODREN®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables



Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : vomissements, diarrhée, nausées, remontées acides, perte de poids</p> <p>Troubles neurologiques : somnolence, vertiges, confusion, fourmillements, troubles de la sensibilité</p> <p>Anomalies du bilan : anomalie du bilan hépatique, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, baisse des globules blancs (leucopénie), baisse de l'hémoglobine (anémie), baisse des plaquettes (thrombopénie)</p> <p>Autres : éruption cutanée, fatigue, saignements, fatigue musculaire, sensibilité et gonflement des seins</p> <p>Insuffisance surrénalienne</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Symptômes évocateurs d'une infection Température > 38,5 °C Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p>Traumatisme, choc</p> <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie Sang dans les selles, ou en cas de vomissements Hématomes (bleus), saignements de nez</p> <p>Troubles digestifs En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleur intense dans le ventre Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48 h</p> <p>Troubles neurologiques Troubles de la motricité et de la coordination, Sensations anormales comme fourmillements et picotements, Perte de mémoire, difficulté à vous concentrer, difficulté à parler, Vertiges</p> <p>Insuffisance surrénale Fatigue, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, confusion</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Insuffisance surrénalienne	<p>Portez sur vous la carte patient LYSODREN® En cas d'urgence, l'équipe médicale doit savoir que vous avez un traitement par LYSODREN® en cours.</p> 
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Saignements Hémorragie	<p>Evitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...)</p> <p>Informez votre médecin: si vous consommez des <i>anticoagulants</i> ou des <i>anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose en cas d'<i>intervention chirurgicale ou dentaire</i></p>
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p>Alternez période d'activité et de repos.</p>



Soins de la peau	Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Évitez toute utilisation de produits irritants. Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.
Manipulation de médicaments anticancéreux	Évitez le contact des comprimés avec la peau. Portez des gants, et lavez vos mains après manipulation.
Comment adapter votre alimentation?	
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Diarrhée	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »

