




OSIMERTINIB - TAGRISSO®

Qu'est-ce que TAGRISSO

Description de la molécule	Description
Osimertinib	Comprimé de 40 mg : beige, rond Comprimé de 80 mg : beige, ovale 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de 1 comprimé de 80 mg par jour, à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser ou couper les comprimés. Comprimés pouvant être dispersés (remuer jusqu'à dispersion dans 50 mL d'eau non gazeuse). Buvez immédiatement le mélange et rincez le verre.

A prendre à heure fixe, au moment ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli : la dose peut être prise dans les 12h. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique, et votre potassium) et clinique (électrocardiogramme).

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre TAGRISSO® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



Exemple : Évitez la consommation de pamplemousse, Millepertuis, Boldo, Fucus, Ginseng asiatique, Orange de Séville, Passiflore, Pissenlit avec le TAGRISSO®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : diarrhées, bouche enflammée (aphtes)</p> <p>Troubles cutanés : éruptions cutanées, démangeaisons, sécheresse cutanée</p> <p>Ongles : paronychie (infection des ongles), décollement des ongles</p> <p>Anomalies du bilan biologique : baisse des plaquettes (thrombopénie) et des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), baisse des globules blancs (leucopénie)</p>
Certains nécessitent une attention particulière	Patients de moins de 55 kg (augmentation du risque d'effets indésirables)
Quand alerter l'équipe médicale ?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. <p>Troubles au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Troubles au niveau des yeux</p> <ul style="list-style-type: none"> > Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <ul style="list-style-type: none"> > Température > 38,5 °C > Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> > Perte de connaissance, palpitations
Comment prévenir les effets indésirables	
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Soins de la peau	<p>Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p>Évitez toute utilisation de produits irritants.</p> <p>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions</p>
Soins des ongles	<p>Évitez les traumatismes de vos ongles des mains et des pieds. Ne mettez pas de vernis sauf si c'est un vernis (protecteur) qui vous a été conseillé spécifiquement par l'équipe soignante.</p> <p>Privilégiez une coupe des ongles droits et pas trop courts.</p>
Yeux	Évitez le port de lentilles de contact. Évitez de conduire en cas de faible luminosité
Infection	Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée pour vous protéger.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	



Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Bouche enflammée (aphtes)	Évitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

