




## PAZOPANIB - VOTRIENT®

### Qu'est-ce que VOTRIENT

Description de la molécule	Description
Pazopanib	Comprimé de 200 mg : rose, ovale Comprimé de 400 mg : blanc, ovale 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.













Dans votre cas, elle est de..... mg par jour, soit .....comprimé(s) de 200 mg et/ou ..... comprimé(s) de 400 mg, à prendre en une seule prise par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe, à distance du repas (1 heure avant le repas, ou 2 heures après le repas)

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, 1h avant ou 2h après un repas									
En continu									

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos fonctions hépatique, rénale et thyroïdienne, votre potassium et recherche de protéines dans vos urines) et clinique (électrocardiogramme, tension artérielle, échographie cardiaque) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre VOTRIENT® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de jus de pamplemousse avec le VOTRIENT®.

### Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre**



**médecin ou votre pharmacien.****Effets indésirables**

Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : diarrhées, nausées, perte de poids, vomissements, trouble du goût, bouche enflammée (aphtes), douleurs abdominales, perte d'appétit</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : modification de la couleur des cheveux et de la peau, éruption cutanée, inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement, perte de cheveux (modéré)</p> <p><b>Douleurs</b> : maux de tête et autres douleurs</p> <p><b>Anomalie du bilan biologique</b>: anomalie du bilan hépatique, baisse des leucocytes (leucopénie), des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), des plaquettes (thrombopénie) et présence de protéines dans vos urines</p> <p><b>Troubles vasculaires</b> : saignements, hypertension artérielle</p> <p><b>Autres</b> : fatigue, trouble du sommeil, vision trouble</p>
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> <li>&gt; Écoulement, abcès ou douleurs au niveau de l'anus</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>&gt; Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>&gt; Hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque ou d'une phlébite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique, perte de connaissance, gonflement des jambes</li> <li>&gt; Faiblesse sur un côté du corps, maux de tête intenses, convulsions, confusion, difficultés pour parler, modifications de la vision ou vertiges importants&lt;</li> <li>&gt; Mollet rouge, chaud et douloureux</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un œdème cérébral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête, confusion, convulsions ou troubles de la vision</li> </ul> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</li> </ul>
<b>Comment prévenir les effets indésirables?</b>	
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est <b>recommandée</b> régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou d'œdèmes



Soins de la peau et des cheveux	<p>Sur vos mains et vos pieds : <b>Appliquez</b> une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement).  <b>Evitez</b> d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude).  <b>Evitez</b> les activités qui génèrent des frottements ou des plaies et le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées</p> <p>Corps : <b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.  <b>Evitez</b> toute utilisation de produits irritants.  <i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p> <p>Cheveux : <b>Utilisez</b> un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité.  <b>Privilégiez</b> une brosse souple. <b>Evitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment. <b>Evitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.</p>
Hygiène dentaire	<p><b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, <b>réalisez</b> des bains de bouche au bicarbonate de sodium.  <b>Evitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool</p>
Saignements / hémorragies	<p><b>Evitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...)  <b>Informez</b> votre médecin:  &gt; si vous consommez des <i>anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose  &gt; en cas d'<i>intervention chirurgicale ou dentaire</i></p>
Infection	<p><b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera</p>
<b>Comment adapter son alimentation ?</b>	
Diarrhées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes.  <b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool.  <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante</p>
Perte de poids	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir ».</p>
Nausées	<p><b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids.  <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés</p>
Bouche enflammée (aphtes)	<p><b>Evitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.</p>
Trouble du goût	<p><b>Favorisez</b> une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour.  <b>Evitez</b> les ustensiles de cuisine métallique.</p>