



## PONATINIB - ICLUSIG®

### Qu'est-ce que ICLUSIG

Description de la molécule	Description
Ponatinib	Comprimés de 15 mg, 30 mg et 45 mg : blancs, ronds  

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de 15 mg et/ou ..... comprimé(s) de 30 mg et/ou ..... comprimé(s) de 45 mg, à prendre en 1 seule prise, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	  
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, vos fonctions hépatique et pancréatique, votre glycémie et votre cholestérol) et clinique (tension artérielle, électrocardiogramme) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatif et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ICLUSIG® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec ICLUSIG®. Evitez la prise de médicaments contre l'acidité gastrique.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissements, diarrhées, constipation et perte de l'appétit</p> <p><b>Troubles généraux</b> : rétention d'eau, étourdissements, fatigue</p> <p><b>Anomalie du bilan biologique</b> : baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), anomalies du bilan hépatique et/ou pancréatique</p> <p><b>Douleurs</b> : douleurs dans les os, les muscles et articulations, maux de tête</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : éruptions cutanées, démangeaisons</p> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b> : infection, toux, difficultés à respirer</p> <p><b>Troubles au niveau cardiaque</b> dont une hypertension artérielle</p> <p><b>Autres</b> : saignements, fatigue et troubles du sommeil</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	<p>Patients porteurs du virus de l'hépatite B</p> <p>Patients diabétiques (risque d'hyperglycémie)</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <p>En cas de perte de poids importante et/ou rapide</p> <p>Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</p> <p>Douleur intense dans le ventre</p> <p>Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</p> <p>Moins de 3 selles par semaine</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <p>Température &gt; 38,5 °C</p> <p>Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <p>Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</p> <p>Hématomes (bleus), saignements de nez</p> <p><b>Troubles au niveau des poumons</b></p> <p>Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</p> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b></p> <p>Maux de tête et/ou douleurs articulaires</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une rétention d'eau</b></p> <p>Augmentation rapide et inattendue de votre poids</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque ou vasculaire</b></p> <p>Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</p> <p>Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</p> <p>Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique ollet rouge, chaud et douloureux</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble neurologique</b></p> <p>Faiblesse sur un côté du corps, maux de tête intenses, convulsions, confusion, difficultés pour parler, modifications de la vision ou vertiges importants</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Soins de la peau	<p><b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Evitez</b> toute utilisation de produits irritants. <i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p>
Poids	<p><b>Surveillez</b> régulièrement <b>votre poids</b> en cas de troubles digestifs ou de rétention d'eau</p>



Rétention d'eau (gonflement des membres)	<b>Evitez</b> les vêtements, chaussettes et chaussures trop serrés. <b>Surélevez</b> vos pieds.
Infection	<b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera.
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est <b>recommandée</b> régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Fatigue / Douleurs articulaires / Constipation	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.
Saignements	<b>Evitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) <b>Informez</b> votre médecin: si vous consommez des <i>anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
<b>Comment adapter son alimentation?</b>	
Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés.
Rétention d'eau	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en sel.
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.

