



## RIPRETINIB - QINLOCK®

### Qu'est-ce que QINLOCK

Description de la molécule	Description
Riprétinib	Comprimé de 50mg

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé de ..... mg à prendre en une seule prise, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper ou disperser les comprimés

A prendre à heure fixe, pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 8 heures. En revanche en cas de vomissements, ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine) et clinique (bilan dermatologique, tension artérielle, bilan cardiaque) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre QINLOCK® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de jus de pamplemousse avec QINLOCK®.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, constipation, bouche enflammée (aphtes) perte d'appétit</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : inflammation de la paume des mains, de la plante des pieds et des zones de frottement (syndrome main/pied), sécheresse, démangeaisons, perte des cheveux, retard à la cicatrisation des plaies</p> <p><b>Autres</b> : hypertension, douleurs musculaires et articulaires, fatigue</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>• Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>• Constipation avec moins de 3 selles par semaine</li> <li>• Douleur intense dans le ventre</li> <li>• Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</li> <li>• Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h</li> </ul> <p><b>Symptômes d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>• Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Symptômes d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppression thoracique</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. <b>Une mesure de la tension artérielle</b> est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Soins de la peau	<p><i>Sur vos mains et vos pieds</i> : <b>Appliquez</b> une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement).</p> <p><b>Évitez</b> d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude).</p> <p><b>Évitez</b> les activités qui génèrent des frottements ou des plaies.</p> <p><b>Évitez</b> le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées</p> <p><i>Corps</i> : <b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil</i>, <b>utilisez</b> un écran total et évitez les expositions.</p>
Hygiène dentaire	<p><b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium.</p> <p><b>Évitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de alcool.</p>
Fatigue	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</p> <p><b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	



Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Perte d'appétit	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Evitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

