



## RUXOLITINIB - JAKAVI®

### Qu'est-ce que JAKAVI

Description de la molécule	Description
Ruxolitinib	Comprimé de 5 mg : blanc, rond Comprimé de 10 mg : blanc, rond Comprimé de 15 mg : blanc, ovale Comprimé de 20 mg : blanc, allongé



### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg / jour, soir 1 comprimé de ..... mg, à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, couper, croquer, ou diluer les comprimés.

A prendre A heure fixe, pendant ou en dehors des repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

2 prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique et votre cholestérol) et clinique (tension artérielle).

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre JAKAVI® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la <sup>1/3</sup> licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis ou de pamplemousse avec JAKAVI®.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles généraux</b> : étourdissements et vertiges</p> <p><b>Anomalie du bilan biologique</b> : baisse des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), anomalie du bilan hépatique et augmentation de votre cholestérol</p> <p><b>Infections</b> dont les infections urinaires</p> <p><b>Douleurs</b> : maux de tête</p> <p><b>Hypertension artérielle</b></p> <p><b>Autres : saignements</b> (hématomes, saignements de nez et des gencives), prise de poids, constipation</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	Patients porteurs du virus de l'hépatite B
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b> Température &gt; 38,5 °C Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b> Sang dans les selles, ou en cas de vomissements Hématomes (bleus), saignements de nez</p> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b> Maux de tête Fatigue</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b> Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids
Infection	<b>Evitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). <b>Une vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est <b>recommandée</b> régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.
Saignements	<b>Evitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) <b>Informez</b> votre médecin: si vous consommez des <i>anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires</i> : une surveillance étroite s'impose en cas d' <i>intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Fatigue / Constipation	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.
Comment adapter son alimentation?	



Prise de poids	<b>Buvez</b> de façon abondante et <b>évit</b> ez les boissons sucrées. <b>Favorisez</b> une alimentation diversifiée : plus de légumes et des fruits, des viandes moins grasses (volailles sans peau, lapin). <b>Prévoyez</b> une collation pour éviter les grignotages. <b>Évit</b> ez les charcuteries, viennoiserie et sucreries diverses, fritures et les produits industriels gras et sucrés.
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.

