




## SUNITINIB MALATE - SUTENT®

### Qu'est-ce que SUTENT

Description de la molécule	Description
Sunitinib	Gélule de 12,5 mg : rouge Gélule de 25 mg : orange et rouge Gélule de 50 mg : orange 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... gélule(s) de 12,5 mg, ..... gélule(s) de 25 mg et/ou ..... gélules(s) de 50 mg, à prendre une fois par jour.






.....  
 (préciser si prise en continu ou non)

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules

A prendre A heure fixe, pendnat ou en dehors du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors du repas	  
En continu	
J1 à J28, toutes les 6 semaines	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

numération de la formule sanguine, vos fonctions hépatique, pancréatique et thyroïdienne et recherche de protéines dans vos urines) et clinique (tension artérielle, electro-cardiogramme, scintigraphie cardiaque) .

## Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

## Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre SUTENT® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis, jus de pamplemousse, Ginkgo Biloba, Orange de Séville, Petit Houx, Réglisse, Yohimbe avec le SUTENT®

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : perte d'appétit, troubles du goût, diarrhées, nausées, bouche enflammée (aphtes), remontées acides, vomissements</p> <p><b>Troubles de la fonction cardiaque</b> dont hypertension</p> <p><b>Troubles cutanés</b>: décoloration de la peau et/ou des cheveux, syndrome main pied, éruptions cutanées, sécheresse</p> <p><b>Anomalies du bilan biologique</b> : troubles de la fonction thyroïdienne (hypothyroïdie), baisse des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), hypoglycémie</p> <p><b>Douleurs</b> : mains, pieds, articulations, maux de tête</p> <p><b>Troubles au niveau des yeux</b> : larmes, gonflement (œdèmes)</p> <p><b>Infections</b></p> <p><b>Autres</b> : fatigue, trouble du sommeil, vertiges, saignements/hémorragies</p>
Certains patients nécessitent une attention particulière	Patients diabétiques (hypoglycémies)
Quand alerter l'équipe médicale?	



<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>&gt; Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>&gt; Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</li> <li>&gt; Douleur intense dans le ventre</li> <li>&gt; Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hypertension</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges</li> <li>&gt; Augmentation des chiffres lors d'une prise de tension</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>&gt; Hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Température &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maux de tête</li> <li>&gt; Douleurs articulaires</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Essoufflement, palpitations, ou douleurs ou oppressions thoraciques</li> </ul> <p><b>Symptômes d'une hypoglycémie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vertiges, nausées, vision trouble, faiblesse musculaire</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une phlébite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mollet rouge, chaud et douloureux</li> </ul>
<p><b>Comment prévenir les effets indésirables?</b></p>	
<p>Suivi de la tension artérielle</p>	<p>Une tension élevée doit être corrigée. Une <b>mesure de la tension artérielle</b> est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre.</p>
<p>Poids</p>	<p>Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs</p>
<p>Hygiène dentaire</p>	<p><b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, <b>réalisez</b> des bains de bouche au bicarbonate de sodium. <b>Évitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de alcool.</p>
<p>Soins de la peau</p>	<p><u>Sur vos mains et vos pieds</u> : <b>Appliquez</b> une crème ou un lait hydratant et/ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds (sans frotter vigoureusement). <b>Évitez</b> d'exposer vos mains et vos pieds à la chaleur (eau chaude). <b>Évitez</b> les activités qui génèrent des frottements ou des plaies et le port de vêtements, chaussettes et chaussures trop serrées <u>Corps</u> : <b>Privilégiez</b> pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. <b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants. Pour se protéger du soleil, <b>utilisez</b> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p>
<p>Fatigue</p>	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
<p>Saignement / hémorragies</p>	<p><b>Évitez</b> la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) <b>Informez</b> votre médecin : &gt; si vous consommez des anticoagulants ou des anti-aggrégants plaquettaires : une surveillance étroite s'impose &gt; en cas d'intervention chirurgicale ou dentaire</p>



Infection	Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> pour vous protéger
<b>Comment adapter son alimentation?</b>	
Perte d'appétit	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Troubles du goût	<b>Favorisez</b> une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour. <b>Évitez</b> les ustensiles de cuisine métallique.
Diarrhée	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés.
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Évitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.
Remontées acides	<b>Évitez</b> la consommation d'alcool, tabac, café, repas copieux et gras. <b>Privilégiez</b> une alimentation fractionnée

