



# TALAZOPARIB - TALZENNA®

## Qu'est-ce que TALZENNA

Description de la molécule	Description
talazoparib	Gélule de 0,25 mg : ivoire et blanche Gélule de 1 mg : rouge et blanche

## Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg par jour, soit ..... gélule(s) de ..... mg, à prendre 1 fois par jour tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules

A prendre A heure fixe, pendant ou en dehors du repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

## Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	
En continu	

## Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

## Quelles sont les autres informations à connaître ?

### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine) .

### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre TALZENNA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de pampleousse, pomélo, Millepertuis, Curcuma, Olivier, Luzerne avec TALZENNA®



## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Généraux</b> : fatigue, maux de tête</p> <p><b>Anomalies du bilan biologique</b> : baisse de l'hémoglobine (anémie), des polynucléaires neutrophiles (neutropénie) et des plaquettes (thrombopénie)</p> <p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, perte d'appétit, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, ulcère de la bouche (aphtes)</p> <p><b>Chute des cheveux</b></p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>• Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>• Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</li> <li>• Douleur intense dans le ventre</li> <li>• Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température &gt; 38,5 °C</li> <li>• Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</li> </ul> <p><b>Symptômes évocateurs d'une hémorragie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang dans les selles, ou en cas de vomissements</li> <li>• Hématomes (bleus), saignements de nez</li> </ul> <p><b>Douleurs empêchant vos activités habituelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Poids	<b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs
Hygiène dentaire	<b>Utilisez</b> une brosse à dent souple, <b>réalisez</b> des bains de bouche au bicarbonate de sodium. <b>Évitez</b> les bains de bouche contenant du menthol ou de l'alcool
Chute des cheveux	Utilisez un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. <b>Privilégiez</b> une brosse souple. <b>Évitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment. <b>Évitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.
Infection	<b>Évitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
Comment adapter son alimentation en cas d'apparition des effets indésirables suivants ?	
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés



Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Evitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Perte d'appétit	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Bouche enflammée (aphtes)	<b>Evitez</b> la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

