




TOPOTECAN - HYCAMTIN®

Qu'est-ce que HYCAMTIN

Description de la molécule	Description
Topotécan	Gélule de 0,25 mg : blanche Gélule de 1 mg : rose 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.



Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit gélule(s) de 0.25 mg et/ou gélule(s) de 1 mg, à prendre en une seule prise par jour, pendant 5 jours consécutifs toutes les 3 semaines

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules.

A prendre A heure fixe, au moment ou en dehors d'un repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	
J1 à J5, reprise à J21	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine et vos fonctions hépatique et rénale) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre HYCAMTIN® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



Exemple : Evitez la consommation d'antioxydants en compléments alimentaires et d' Olivier avec l'Hycantin®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Anomalies du bilan biologique : baisse des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), des plaquettes (thrombopénie), de l'hémoglobine (anémie), des leucocytes (leucopénie) et anomalie du bilan hépatique.</p> <p>Troubles digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, perte de poids, constipation, bouche enflammée (aphtes), douleurs abdominales</p> <p>Troubles cutanés : perte des cheveux, démangeaisons, rash</p> <p>Autres : fatigue, infections, fièvre</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale Douleur intense dans le ventre Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. Moins de 3 selles par semaine</p> <p>Symptômes évocateurs d'une infection Température > 38,5 °C Toux, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée ou douleurs au ventre avec fièvre</p> <p>Troubles au niveau des poumons Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire</p> <p>Symptômes d'une allergie Démangeaisons avec éruption Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge, entraînant des difficultés pour avaler ou respirer</p>
Comment prévenir les effets indésirables	
Manipulation d'un médicament anticancéreux	Evitez le contact des gélules avec la peau. Portez des gants, et lavez vos mains après manipulation.
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.
Infection	Evitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera
Hygiène dentaire	Utilisez une brosse à dent souple, réalisez des bains de bouche au bicarbonate de sodium. Evitez les bains de bouche contenant du menthol ou de alcool.
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Chute des cheveux	Faites couper vos cheveux. Informez -vous sur les perruques et leur remboursement. Utilisez un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. Privilégiez une brosse souple. Evitez de laver vos cheveux trop fréquemment. Evitez les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.
Comment adapter son alimentation?	



Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir ».
Constipation	Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.
bouche enflammée (aphtes)	Évitez la consommation d'aliments acides ou qui collent et les aliments très salés.

