




VENETOCLAX - VENCLYXTO®

Qu'est-ce que VENCLYXTO

Description de la molécule	Description
Vénétoclax	Comprimé de 10 mg : rond, jaune clair Comprimé de 50 mg : ovale, beige Comprimé de 100 mg : ovale, jaune clair 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit comprimé(s) de mg à prendre 1 fois par jour, tous les jours. **Initiation par augmentation croissante de la dose** pendant semaines (de à mg avec doublement chaque semaine).

>Semaine 1 : mg/jour

>Semaine 2 : mg/jour

>Semaine 3 : mg/jour

>Semaine 4 : mg/jour

>A partir de la semaine 5 : mg/jour





Pendant la phase de titration **boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour**

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, croquer ou couper les comprimés.

A prendre A heure fixe, au cours du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, au cours d'un repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction rénale et votre bilan biochimique) .

Contraception



Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre VENCLYXTO® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Évitez la consommation de Millepertuis (*Hypericum perforatum*), sauge, curcuma, menthe poivrée, passiflore, aubépine sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...) ainsi que du pamplemousse (jus, pulpe), les oranges amères ou la carambole

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, douleurs abdominales</p> <p>Fatigue</p> <p>Troubles urinaires : infections urinaires, urines foncées, augmentation de la créatinine</p> <p>Troubles pulmonaires : infections</p> <p>Anomalie du bilan biologique : baisse de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie).</p> <p>Syndrome de lyse tumorale : augmentation du potassium, phosphore et de l'urée (hyperkaliémie, hyperphosphatémie, hyperuricémie). Baisse du calcium (hypocalcémie)</p>
Patients nécessitant une attention particulière	Patients sous anti-vitamine K (une surveillance étroite de l'INR est recommandée)
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs</p> <p>En cas de perte de poids importante et/ou rapide</p> <p>Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</p> <p>Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</p> <p>Douleur intense dans le ventre</p> <p>Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</p> <p>Moins de 3 selles par semaine</p> <p>Symptômes évocateurs d'une infection</p> <p>Température > 38,5 °C</p> <p>Toux, difficulté respiratoire, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p>Symptômes d'une allergie</p> <p>Démangeaisons avec éruption</p> <p>Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge, entraînant des difficultés pour avaler ou respirer</p> <p>Symptômes évocateurs d'un syndrome de lyse tumoral</p> <p>Coloration de vos urines,</p> <p>Diminution de la quantité d'urine éliminée</p> <p>Douleur sur un côté en dessous des côtes</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera
Infertilité	Renseignez-vous auprès de votre médecin avant le début du traitement sur les moyens de conservation du sperme



Constipation	<i>Pour stimuler le transit, pratiquez une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...</i>
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Soins de la peau	<i>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</i>
Manipulation d'un médicament anticancéreux	Évitez le contact des comprimés avec la peau. Portez des gants, et lavez vos mains après manipulation.
Comment adapter son alimentation ?	
Diarrhées	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante si possible 2 litres par jour
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés
Constipation	Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.

