




## VENETOCLAX - VENCLYXTO®

### Qu'est-ce que VENCLYXTO

Description de la molécule	Description
Vénétoclax	Comprimé de 10 mg : rond, jaune clair Comprimé de 50 mg : ovale, beige Comprimé de 100 mg : ovale, jaune clair 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... comprimé(s) de ..... mg à prendre 1 fois par jour, tous les jours. **Initiation par augmentation croissante de la dose** pendant ..... semaines (de ..... à ..... mg avec doublement chaque semaine).

>Semaine 1 : ..... mg/jour

>Semaine 2 : ..... mg/jour

>Semaine 3 : ..... mg/jour

>Semaine 4 : ..... mg/jour

>A partir de la semaine 5 : ..... mg/jour





Pendant la phase de titration **boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour**

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans écraser, croquer ou couper les comprimés.

A prendre A heure fixe, au cours du repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, au cours d'un repas	  
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction rénale et votre bilan biochimique) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre VENCLYXTO® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Évitez la consommation de Millepertuis (*Hypericum perforatum*), sauge, curcuma, menthe poivrée, passiflore, aubépine sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...) ainsi que du pamplemousse (jus, pulpe), les oranges amères ou la carambole

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles digestifs</b> : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, douleurs abdominales</p> <p><b>Fatigue</b></p> <p><b>Troubles urinaires</b> : infections urinaires, urines foncées, augmentation de la créatinine</p> <p><b>Troubles pulmonaires</b> : infections</p> <p><b>Anomalie du bilan biologique</b> : baisse de l'hémoglobine (anémie), et/ou des polynucléaires neutrophiles (neutropénie).</p> <p><b>Syndrome de lyse tumorale</b> : augmentation du potassium, phosphore et de l'urée (hyperkaliémie, hyperphosphatémie, hyperuricémie). Baisse du calcium (hypocalcémie)</p>
Patients nécessitant une attention particulière	Patients sous anti-vitamine K (une surveillance étroite de l'INR est recommandée)
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Troubles digestifs</b></p> <p>En cas de perte de poids importante et/ou rapide</p> <p>Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</p> <p>Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale</p> <p>Douleur intense dans le ventre</p> <p>Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</p> <p>Moins de 3 selles par semaine</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'une infection</b></p> <p>Température &gt; 38,5 °C</p> <p>Toux, difficulté respiratoire, douleur de gorge, douleur pour uriner, diarrhée avec fièvre</p> <p><b>Symptômes d'une allergie</b></p> <p>Démangeaisons avec éruption</p> <p>Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge, entraînant des difficultés pour avaler ou respirer</p> <p><b>Symptômes évocateurs d'un syndrome de lyse tumoral</b></p> <p>Coloration de vos urines,</p> <p>Diminution de la quantité d'urine éliminée</p> <p>Douleur sur un côté en dessous des côtes</p>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Infection	<b>Évitez</b> de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une <b>vaccination</b> contre la grippe et le pneumocoque peut vous être <b>recommandée</b> : elle vous protégera
Infertilité	<b>Renseignez-vous</b> auprès de votre médecin avant le début du traitement sur les moyens de conservation du sperme



Constipation	<i>Pour stimuler le transit, <b>pratiquez</b> une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...</i>
Fatigue	<b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport... <b>Alternez</b> période d'activité et de repos.
Soins de la peau	<i>Pour se protéger du soleil, <b>utilisez</b> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</i>
Manipulation d'un médicament anticancéreux	<b>Évitez</b> le contact des comprimés avec la peau. <b>Portez</b> des gants, et <b>lavez</b> vos mains après manipulation.
<b>Comment adapter son alimentation ?</b>	
Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante si possible 2 litres par jour
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.

