



## VISMODEGIB - ERIVEDGE®

### Qu'est-ce que ERIVEDGE

Description de la molécule	Description
Vismodegib	Gélule de 150 mg : bleu et rose 

### Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.

Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit ..... gélule(s), à prendre une fois par jour, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans ouvrir ou dissoudre les gélules

A prendre A heure fixe, au moment ou en dehors du repas

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

### Posologie - Mode d'administration

1 prise par 24h, à heure fixe, pendant ou en dehors du repas	  
En continu	

### Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

### Quelles sont les autres informations à connaître ?

#### Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre Numération de la Formule Sanguine, votre fonction hépatique et musculaire) et clinique (tests de grossesse) .

#### Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

#### Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ERIVEDGE® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de Millepertuis et des antioxydants avec l'ERIVEDGE®

### Quels sont les effets indésirables éventuels ?



**Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.**

Les effets indésirables	
Les plus fréquents	<p><b>Troubles musculo-squelettiques</b> : contractions musculaires, douleurs aux articulations et aux extrémités</p> <p><b>Troubles cutanés</b> : perte de cheveux, démangeaisons, rash</p> <p><b>Troubles digestifs</b> : troubles du goût, perte de poids, nausées, diarrhées, remontées acides, constipation</p> <p><b>Fatigue</b></p>
Patients nécessitant une attention particulière pendant le traitement	<p><b>Femmes en âge de procréer</b> (grossesse contre-indiquée, tératogène, risque de malformation du fœtus)</p> <p><b>Hommes</b> (préservatifs obligatoire lors des rapports sexuels)</p>
Quand alerter l'équipe médicale?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p><b>Suspicion de grossesse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>chez les femmes traitées</li> <li>chez le partenaire pour les hommes traités</li> </ul> <p><b>Troubles cutanés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apparition de verrues</li> <li>Peau douloureuse ou bosse rougeâtre sur la peau accompagnée de saignements ou ne cicatrisant pas</li> <li>Changement de taille ou de couleur d'un grain de beauté</li> </ul> <p><b>Troubles digestifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de perte de poids importante et/ou rapide</li> <li>Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour</li> <li>Douleur intense dans le ventre</li> <li>Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</li> <li>Moins de 3 selles par semaine</li> </ul>
Comment prévenir les effets indésirables?	
Femmes en âge de procréer	<p><b>Grossesse contre-indiquée</b>, risque de malformation du fœtus.</p> <p><b>Utilisez</b> deux méthodes contraceptives lors des rapports sexuels pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 2 ans après la dernière prise.</p> <p><b>Réalisez</b> un test de grossesse tous les mois et jusqu'à 2 ans après la dernière prise.</p>
Hommes	<p><b>Utilisez</b> un préservatif lors de vos rapports sexuels pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 2 mois après la dernière prise.</p>
Fatigue	<p><b>Privilégiez</b> des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, nage, vélo, sport...</p> <p><b>Alternez</b> période d'activité et de repos.</p>
Poids	<p><b>Surveillez</b> régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs.</p>
Soins de la peau	<p><b>Privilégiez pour la toilette</b> un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement.</p> <p><b>Évitez</b> toute utilisation de produits irritants.</p> <p><i>Pour se protéger du soleil, utilisez</i> un écran total et <b>évitez</b> les expositions.</p>
Chute des cheveux	<p><b>Utilisez</b> un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité.</p> <p><b>Privilégiez</b> une brosse souple.</p> <p><b>Évitez</b> de laver vos cheveux trop fréquemment.</p> <p><b>Évitez</b> les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes.</p>



**Comment adapter son alimentation?**

Troubles du goût	<b>Favorisez</b> une alimentation tiède ou froide en plusieurs petits repas par jour. <b>Évitez</b> les ustensiles de cuisine métallique.
Perte de poids	<b>Privilégiez</b> une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir ».
Nausées	<b>Privilégiez</b> une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. <b>Limitez</b> les aliments gras, frits et épicés
Diarrhées	<b>Privilégiez</b> une alimentation pauvre en fibres. <b>Consommez</b> de préférence des féculents, des carottes, des bananes. <b>Évitez</b> de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante
Constipation	<b>Privilégiez</b> une alimentation enrichie en fibres. <b>Buvez</b> de l'eau de façon abondante.
Remontées acides	<b>Évitez</b> les facteurs de risques : alcool, tabac, café, repas copieux et gras. <b>Privilégiez</b> une alimentation fractionnée.

