



Fiche d'aide à la délivrance de chimiothérapie destinée aux professionnels de santé

# SOTORASIB - LUMYKRAS®

### Présentation

Classification médicamenteuse	Dosage	Photographies	
Inhibiteur de la protéine KRAS G12C	120 mg	LANGAS EGGEN Marca para in a constraint in a	

## **Indications AMM**

#### Autorisation d'accès précoce :

Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique avec mutation KRAS G12C, en monothérapie et après progression après au moins une première ligne de traitement.

# Posologie - Mode d'administration

1 prise par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors d'un repas	<b>6</b>		
En continu	<b>⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘</b>	3 J4 J5 J6	J28

- Posologie : 960 mg x1/jour soit 8 comprimés x1/jour
- Adaptations des doses possibles jusqu' à 240 mg par jour par palier de 480 mg puis de 240 mg en fonction de la tolérance
- En cas d'oubli: prendre la dose, si retard < 6h
- En cas de vomissement : ne pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante
- Comprimé à avaler entier avec un verre d'eau. Comprimés pouvant être dissouts dans un demi verre d'eau (température ambiante). NB : le comprimé ne se dissout pas intégralement, recommander de rincer la poudre restante dans le verre avec de l'eau
- Conservation < 25°C : ne pas déconditionner les comprimés dans un pilulier

# Conditions de prescription et délivrance

Disponible en pharmacie hospitalière (en AAP post-AMM)

Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

### Effets indésirables

Toxicité	Fréquence	Grade	Surveillance/Prévention
<b>Gastro-Intestinale</b>			
Nausées, vomissements	TRES FREQUENT	Grade 1 à 3	Surveillance de la perte de poids. Alimentation i) fragmentée en plusieurs repas légers, ii) liquide et froide et iii) moins grasse, sans friture ou épices. Prescription possible de traitements antiémétiques.



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International .

Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.

Toxicité	Fréquence	Grade	Surveillance/Prévention		
Diarrhées, douleurs abdominales	TRES FREQUENT	Grade 1 à 3	Hydratation adéquate et prescription de traitements anti- diarrhéiques dès les premiers signes surtout en début de traitement Alimentation pauvre en fibre avec féculents, carotte, banane et éviter fruit et légumes crus, laitage, café et alcool.		
Généraux					
Fatigue	TRES FREQUENT		Activités indispensables et celles qui procurent un bien-être à privilégier, activité sportive adaptée et régulière à encourager.		
Fièvre	TRES FREQUENT	Grade 1 à 2	Surveillance de la température. Consultation médicale si T° > 38,5°C		
Douleurs (dorsales, céphalées)	TRES FREQUENT	Grade 1 à 3	Prescription possible d'antalgique et d'AINS		
Arthralgies, myalgies	TRES FREQUENT	Grade 1 à 2/3			
Oedème	TRES FREQUENT	Grade 1 à 2			
Métabolique					
Diminution de l'appétit	TRES FREQUENT	Grade 1 à 3	Surveillance de la perte de poids. Alimentation i) fragmentée en plusieurs repas légers, ii) liquide et froide et iii) moins grasse, sans friture ou épices.		
Augmentation ASAT, ALAT, bilirubinémie	TRES FREQUENT	Grade 1 à 4	Surveillance par un bilan hépatique régulier Si ALAT/ASAT de grade 2 avec symptômes ou ALAT/ASAT de grade 3 : arrêt jusqu'à résolution à un grade ? 1 puis reprise au palier inférieur Si ALAT/ASAT>3N et bilirubine>2N : arrêt définitif		
Hématologique					
Anémie	FREQUENT	Grade 1 à 3	Surveillance de la NFS régulière. Arrêt du traitement si hémoglobine ? 8 g/dL.  Toxicité de grade ? 3 : arrêt jusqu'à résolution à un grade inférieur à 1 puis reprise au palier inférieur		
Neutropénie	PEU FREQUENT	Grade 1 à 3	Surveillance de la NFS régulière. Arrêt du traitement si PNN ? 1G/L. Toxicité de grade ? 3 : arrêt jusqu'à résolution à un grade inférieur à 1 puis reprise au palier inférieur		
Respiratoire	Respiratoire				
Dyspnée	TRES FREQUENT	Grade 1 à 4	Surveillance fonction respiratoire		
Toux	TRES FREQUENT	Grade 1 à 2	Surveillance fonction respiratoire		
Pneumopathie interstitielle	PEU FREQUENT	Grade 3 à 4	Surveillance toux et dyspnée, consultation médicale si majoration des symptomes.		

Pour toute information complémentaire concernant les effets indésirables et leur gestion, consulter les « recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables des anticancéreux par voie orale » de l'Institut National du Cancer

# Populations particulières et recommandations

Insuffisance hépatique : aucune adaptation de la posologie en cas d'insuffisance hépatique légère. Absence d'études en cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère

Insuffisance rénale : aucune adaptation de la posologie en cas d'insuffisance rénale légère (DFG>60 mL/min). Absence d'études en cas d'insuffisance rénale modérée à sévère.

Patients âgés : aucune adaptation de la posologique chez le sujet âgé

Population pédiatrique : utilisation non évaluée en pédiatrie



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions

4.0 International .
Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.



#### Bilan biologique

Surveillance régulière : NFS, plaquettes bilan hépatique et rénal



#### Grossesse et allaitement

Contraception recommandée chez les femmes pendant le traitement. Allaitement non-recommandé.



#### Surveillance clinique

Aggravation d'une toux ou d'une dyspnée

## Métabolismes et transporteurs

		3A4/5	P-gp	BCRP		
Substrat						
Inducteur						
Inhibiteur						
	Voie métabolique majeure / inhibiteur-inducteur puissant					
	Voie métabolique mineure / inhibiteur-inducteur modéré					

## Interactions médicamenteuses majeures

#### EFFETS DES AUTRES MEDICAMENTS SUR LE TRAITEMENT ANTICANCEREUX

Avec les inhibiteurs puissants du CYP 3A4 : augmentation des concentrations plasmatiques du dasatinib pouvant majorer les effets indésirables

Antihypertenseurs et antiarythmiques : amiodarone, diltiazem, verapamil

Antifongiques azolés : fluconazole, kétonazole, voriconazole Antibiotiques macrolides : clarithromycine, télithromycine, erythromycine (sauf spiramycine)

Antirétroviraux inhibiteurs de protéase : indinavir, ritonavir,

lopinavir/ritonavir, saquinavir, nelfinavir, etc.

Autre: Cimétidine

### Conseil(s):

Association déconseillée

#### EFFETS DU TRAITEMENT ANTICANCEREUX SUR LES AUTRES MEDICAMENTS

Avec les inducteurs puissants du CYP 3A4 : diminution des concentrations plasmatiques pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique

Antiépileptiques: carbamazépine, oxcarbazépine, phénytoïne,

fosphénytoïne, phénobarbital, primidone Antibiotiques: rifampicine, rifabutine

Autres: Efavirenz, bosentan, dexamethasone (usage systémique)

Conseil(s):

Association déconseillée.

#### EFFETS DU TRAITEMENT ANTICANCEREUX SUR LES AUTRES MEDICAMENTS

Avec les substrats du CYP 3A4 et de la p-gp: diminution des concentrations plasmatiques des autres médicaments

Antiarythmiques: amiodarone, digoxine

Immunosuppresseurs: ciclosporine, tacrolimus, sirolimus

Statines: simvastatine, atorvastatine

Conseil(s):

Surveillance adaptée en cas d'association

### EFFETS DES AUTRES MEDICAMENTS SUR LE TRAITEMENT ANTICANCEREUX

Avec les antiacides (inhibiteurs de la pompe à protons et les antiH2) : inhibition de la résorption digestive du Sotorasib avec impact significatif sur la concentration max et l'exposition (AUC).

IPP: eso/omeprazole, pantoprazole, lansoprazole

Anti - H2: cimetidine, ranitidine Pansements intestinaux (antiacides) Conseil(s):

Prises espacées:

- ITK 2h avant ou 10h après IPP et anti-H2
- ITK 2h avant ou après protecteur gastrique

# Interactions avec la phytothérapie



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Fondé(e) sur une œuvre à https://oncolien.sfpo.com.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://www.sfpo.com

Société Française de Pharmacie Oncologique - Fiche d'aide à la délivrance de chimiothérapie destinée aux professionnels de santé

Fiche SOTORASIB - LUMYKRAS® - Fiche mise à jour le 17 avril 2025

Certaines plantes et ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. Néanmoins, les niveaux d'interactions dépendront de l'exposition. La quantité consommée, la fréquence, une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel, devront être pris en compte.

Inhibiteur du CYP 3A4 : Jus de pamplemousse, jus d'orange amère (orange de Séville), Citron vert, Pomélo, Aloe Vera, Chardon Marie, Curcuma, Fenouil, Fenugrec, Fumeterre, Gattilier, Gingembre, Ginko biloba, Grenade, Gui, Harpagophytum, Huanglian, Lin, Mahonia, Menthe poivrée, Myrtille, Olivier, Orthosiphon, Poivre noire, Prêle, levure de Riz rouge, Trèfle rouge

Inducteur du CYP 3A4 : Millepertuis, Ail, Aubépine, Echinacée, Kava Kava, Menthe verte, Sauge Antioxydants : Thé vert, Sélénium, Vitamines C et E (à forte dose), Desmodium