



BINIMETINIB - MEKTOVI®

Qu'est-ce que MEKTOVI

Description de la molécule	Description
Binimetinib	<p>Comprimés pelliculés jaune à jaune foncé, non sécables, gravés avec le logo « A » sur un côté et « 15 » de l'autre côté.</p> 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.





Dans votre cas, elle est de..... mg/jour, soit comprimé(s) de 15 mg à prendre 2 fois par jour, tous les jours.

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans mâcher, écraser, dissoudre ou diviser les comprimés

A prendre A heure fixe. Pendant ou en dehors des repas.

En cas d'oubli, la dose peut être prise dans les 6 heures. En revanche, en cas de vomissement, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Deux prises par jour, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas	  
En continu	

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre numération de la formule sanguine, votre fonction hépatique) et clinique (fonction cardiaque, suivi tensionnel, suivi dermatologique, suivi ophtalmologique) .

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs, pilule contraceptive et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre MEKTOVI® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.



Exemple : Évitez la consommation de Millepertuis avec MEKTOVI®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables	
Les plus fréquents	<p>Troubles de la numération de la formule sanguine : baisse des polynucléaires neutrophiles (neutropénie), de l'hémoglobine (anémie), des plaquettes (thrombopénie), baisse des électrolytes, anomalie du bilan hépatique et rénal</p> <p>Troubles digestifs : nausées, diarrhée, constipation, perte d'appétit, douleurs abdominales</p> <p>Troubles cutanés : sécheresse cutanée, rash cutané, rougeurs, démangeaisons</p> <p>Troubles de la fonction cardiaque : augmentation de la pression artérielle, risque de saignement, augmentation du rythme cardiaque, thrombose veineuse.</p> <p>Troubles au niveau des yeux : trouble de la vision</p> <p>Douleurs articulaires et /ou musculaires : crampes, courbatures</p> <p>Autres : neuropathies périphériques, fatigue, gonflement des membres, maux de tête, insomnie, vertiges</p>
Quand alerter l'équipe médicale ?	
Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques	<p>Troubles digestifs En cas de perte de poids importante et/ou rapide Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour Douleurs dans la bouche ou aphtes empêchant une alimentation normale Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h.</p> <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque Perte de connaissance, essoufflement, palpitations</p> <p>Symptômes évocateurs d'une hémorragie Sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez</p> <p>Douleurs empêchant vos activités habituelles</p>
Comment prévenir les effets indésirables ?	
Infection	Évitez de vous rendre dans les lieux à risque (foule, contact personnes malades...). Une vaccination contre la grippe, la covid et le pneumocoque peut vous être recommandée : elle vous protégera
Soins de la peau	Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Évitez toute utilisation de produits irritants. Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.
Fatigue	Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.
Poids	Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs, de perte d'appétit ou d'œdèmes
Yeux	Évitez le port de lentilles de contact. Évitez de conduire en cas de faible luminosité
Douleurs musculaires / articulaires	Pensez à bien vous hydrater avant, pendant et après un effort. Pratiquez une activité physique régulière et adaptée, échauffez vous au préalable. Évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.



Saignements	Evitez la prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...) Informez votre médecin: > si vous consommez des anticoagulants ou des anti-agrégants plaquettaires : une surveillance étroite s'impose > <i>en cas d'intervention chirurgicale ou dentaire</i>
Chute ou modification de la texture des cheveux	Utilisez un shampoing doux (pour bébés) en petite quantité. Privilégiez une brosse souple. Evitez de laver vos cheveux trop fréquemment. Evitez les sources de chaleurs (séchoir, bigoudis chauffants, fers chauds), les teintures, balayages et permanentes
Suivi de la tension	Une tension élevée doit être corrigée. Une mesure de la tension artérielle est recommandée régulièrement. Les pharmaciens peuvent vous aider à la prise de votre tension. Vous pouvez aussi demander à le faire vous-même grâce à un auto-tensiomètre. Limitez votre consommation en sel.
Comment adapter son alimentation ?	
Nausées	Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés.
Perte d'appétit	Privilégiez une alimentation plus calorique et une « alimentation plaisir »
Diarrhée	Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Evitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante.
Constipation	Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.

