



SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE  
ONCOLIEN®

Fiche d'aide à la délivrance de chimiothérapie destinée aux professionnels de santé

## Thioguanine – LANVIS®

### Présentation














Classification médicamenteuse	Dosage	Photographies
Cytotoxique antimétabolite (des bases puriques, analogue de la guanine)	40 mg	

### Indications AMM

- **Leucémies** aiguës myéloïdes et des leucémies aiguës lymphoïdes (traitement d'entretien).

*D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées*

### Posologie - Mode d'administration

Une à 2 prises par jour, à heure fixe, en dehrs des repas										
	< 1h — 2h >	< 1h — 2h >	< 1h — 2h >							
En continu										
	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	...	J28	

- Posologie :
  - Adulte : **de 60 à 200 mg/m<sup>2</sup>/ jour** (en une à deux prise), tous les jours
  - Pédiatrie : **de 60 à 100 mg/m<sup>2</sup>/ jour** (en une à deux prise), tous les jours
- Adaptation des doses possibles en fonction de la tolérance, de la fonction rénale ou hépatique, ou d'un déficit génétique en TPMT ou NUDT15
- En cas d'oubli : ne pas prendre la prise oubliée, mais attendre la prise suivante
- En cas de vomissement : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.
- Comprimés à **avalent entiers** avec un verre d'eau, pouvant être coupés (comprimés sécables). Ne pas écraser
- Comprimés à prendre, **à heure fixe**, à distance des repas (taux plasmatique diminué par la prise de nourriture).
- Conservation <25°C, ne pas déconditionner les comprimés dans un pilulier

### Conditions de prescription et délivrance

Disponible **en rétrocession**

**Prescription hospitalière** réservée aux médecins spécialisés en cancérologie, hématologie et oncologie médicale

Médicament nécessitant une **surveillance particulière** pendant le traitement



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>



## Effets indésirables

Toxicité	Fréquence	Grade	Surveillance / Prévention
<b>HEMATOLOGIQUE</b>			
Leucopénie, Thrombopénie	Très fréquent	1 - 2	Surveillance de la NFS régulière. Nadir après 10 jours de traitement. Arrêt du traitement si PNN ? 1G/L, ou plaquettes ? 50 G/L.
<b>HEPATIQUE</b>			
Hépatite, élévation des enzymes hépatiques Cholestase, cytolysse Maladie Veino-Occlusive, hypertension portale	Très fréquent		Surveillance par un bilan hépatique régulier. <b>Arrêt</b> de traitement (réversible à l'arrêt du traitement) Lors d'une <b>prescription prolongée</b> , risque élevé de : – maladie veino-occlusive hépatique : hyperbilirubinémie, hépatomégalie sensible, prise de poids liée à une rétention hydrique et ascite – hypertension portale : splénomégalie, thrombocytopénie et varices œsophagiennes
<b>GASTRO-INTESTINALE</b>			
Nausées, vomissements	Fréquent	1	Faiblement émétisant. Nausées doses dépendantes.
Stomatite, mucite, œsophagite	Fréquent	1	Alimentation adaptée en évitant les aliments acides, qui collent et très salés. En prévention, utilisation d'une brosse à dent souple, d'un bain de bouche avec bicarbonate de sodium sans adjonction d'autres produits et éviter les bains de bouches avec menthol. En curatif, prescription possible de bains de bouche avec bicarbonate et antifongique, et de topiques anesthésiants
<b>CUTANEE</b>			
Photosensibilité	Fréquence indéterminée		Exposition au soleil à éviter et utilisation d'un écran total
<b>RENALE</b>			
Hyperuricémie avec risque de lithiase	Fréquent		Surveillance de la fonction rénale régulière

## Populations particulières et recommandations

- **Insuffisance hépatique** : métabolisation hépatique importante. Adaptation de la posologie initiale en cas d'insuffisance hépatique.
- **Insuffisance rénale** : élimination rénale importante. Adaptation de la posologie initiale en cas d'insuffisance rénale.
- **Patients âgés** : Aucune adaptation de la posologie chez le sujet âgé (pas de majoration des effets indésirables).
- **Autre précautions**

- **Déficit en ThioPurine S-MéthylTransférase (TPMT)** : déficit majorant le risque d'effet indésirable pouvant nécessiter une adaptation posologique. Un **dépistage** du déficit peut être **recommandé**.
- **Déficit en NUDT15** : déficit majorant le risque d'effet indésirable pouvant nécessiter une adaptation posologique. **Dépistage** du déficit

 <p><b>Bilan biologique</b> NFS / Plaquette hebdomadaire / bilan hépatique et rénal</p>	 <p><b>Grossesse et allaitement</b> Allaitement contre-indiqué. Contraception obligatoire chez les femmes et les hommes pendant le traitement.</p>
--	---

## Interactions médicamenteuses majeures



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).  
Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.  
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

La thioguanine est largement métabolisée au niveau hépatique. Les principales enzymes responsables de son métabolisme sont : l'Hypoxanthine (guanine) PhosphoRibosyl Transférase (H(G)PRT), la TPMT, la xanthine oxydase (XDH ou XO) et l'aldéhyde oxydase (AO), la guanine désaminase (GDA).

- Avec certains médicaments **pouvant majorer les effets indésirables de la thioguanine**

Médicaments	Conseils
Busulfan	<b>Association contre-indiquée</b> : aggravation des effets indésirables pulmonaires du busulfan et la toxicité hépatique

Médicaments	Conseils
Dérivés du 5-ASA : mésalazine, olsalazine, sulfasalazine	Association à prendre en compte. Majoration des effets indésirables hématologiques

- Avec les médicaments hépatotoxiques

Médicaments	Conseils
<p><b>Anesthésiques halogénés</b></p> <p><b>Analgésiques et anti-inflammatoires</b> : celecoxib, indométacine, méloxicam, paracétamol (si sirdosage), sulindac</p> <p><b>Antirétroviraux</b> : amprénavir, didanosine, indinavir, lamivudine, nelfinavir, névirapine, ritonavir, saquinavir, etc</p> <p><b>Autres anti-infectieux</b>: acide clavulaniques, cyclines, itraconazole, kétoconazole, macrolides, nitrofurantoïne, sulfamides, terbinafine, etc</p> <p><b>Cardiologie</b>: amiodarone, IEC, methyldopa, nicorandil, sartans, ticlodipine, etc</p> <p><b>Antidépresseurs</b> : AD imipraminiques, paroxétine, sertraline, iproniazide</p> <p><b>Antiépileptiques</b>: acide valproïque, barbituriques, carbamazépine, gabapentine, lamotrigine, phénytoïne, prégabaline, topiramate</p> <p><b>Autres médicaments SNC</b> : Phénothiazines, disulfirame, entacapone, sulpiride</p> <p><b>Troubles métaboliques</b> : statines, sulfamides hypoglycémiant, répaglinide, fibrates, orlistat, acarbose</p> <p><b>Autres</b> : allopurinol, antihistaminiques H1 et H2, etc</p>	Surveillance renforcée en cas d'association.

- Avec certains vaccins : **risque de maladie vaccinale généralisée mortelle.**

Médicaments	Conseils
<b>Vaccins vivants</b> : Vaccin contre la fièvre jaune	<b>Association contre-indiquée.</b>

Médicaments	Conseils
<b>Vaccins vivants atténués</b> : gastro-entérite, certains virus contre la grippe, oreillons, rougeole, rubéole, tuberculose, varicelle, zona	Association déconseillée. Utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe (grippe).

- Autre

Médicaments	Conseils
-------------	----------



ONCOLIEN de SFPO est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.  
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

Phénytoïne

**Association contre-indiquée si prescrit en prophylaxie.** Risque de survenue de convulsions par diminution de l'absorption digestive de la phénytoïne par le cytotatique.



ONCOLIEN de [SFPO](https://www.sfpo.com) est mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).  
Fondé(e) sur une œuvre à <https://oncolien.sfpo.com>.

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <https://www.sfpo.com>

## Interactions avec la phytothérapie

Certaines plantes et ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. Néanmoins, les niveaux d'interactions dépendront de l'exposition. La quantité consommée, la fréquence, une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel, devront être pris en compte.

- **Pouvant majorer une hépatotoxicité** : Actée à grappes, Boldo, Cannelier de Chine, Chardon à glu, Créosotier, Eupatoire perfoliée, Germandrée petit chêne, Grande consoude, Hoffe, Impila, Jin Bu Huan, Kava, Menthe pouliot, Palmier de Floride Pelargonium, Persil, Petit Houx, Polygonum multiflorum, Prêle, Scutellaire latérflore, Thé, Tusanqi, Tussilage, levure rouge de riz.

