


Qu'est-ce que ZYKADIA®

Description de la molécule	Description
Céritinib	Gélule de 150 mg, bleue et blanche 

Comment prendre votre traitement ?

La posologie de votre traitement a été définie par votre médecin.


Dans votre cas, elle est de mg / jour, soit gélules de 150 mg par jour, à prendre en une seule prise, tous les jours

A avaler en entier, avec un verre d'eau, sans être ouvertes ou dissoutes.

A prendre à heure fixe au cours d'un repas.

En cas d'oubli ou de vomissements : ne pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante.

Posologie - Mode d'administration

Une prise par jour, à heure fixe, pendant un repas	
En continu	<input checked="" type="checkbox"/> J1 <input checked="" type="checkbox"/> J2 <input checked="" type="checkbox"/> J3 <input checked="" type="checkbox"/> J4 <input checked="" type="checkbox"/> J5 <input checked="" type="checkbox"/> J6 <input checked="" type="checkbox"/> J7 ... <input checked="" type="checkbox"/> J28

Comment gérer le stock de votre traitement ?

Ce médicament est disponible en pharmacie de ville.

Son approvisionnement peut nécessiter un délai. Soyez vigilant et anticipez le renouvellement de votre ordonnance.

Conservez ce traitement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Quelles sont les autres informations à connaître ?

Précautions et surveillance :

La prise de votre médicament nécessite une surveillance biologique (prise de sang permettant de surveiller votre fonction hépatique, votre potassium, votre glycémie) et clinique (tension

artérielle, électro-cardiogramme).

Contraception

Ce traitement pourrait être nocif pour un enfant à naître. Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.

Interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation

La survenue d'interactions entre ZYKADIA® et vos autres traitements peut avoir des effets néfastes (diminution de l'efficacité du médicament et de sa tolérance). Il est important d'informer votre pharmacien et votre médecin de l'ensemble des médicaments et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires, etc) que vous consommez.

Exemple : Evitez la consommation de pamplemousse, Millepertuis, Boldo, Fucus, Passiflore avec le ZYKADIA®

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Seuls les effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessous. D'autres effets indésirables sont possibles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES	
Les plus fréquents	Troubles digestifs : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, perte de poids et d'appétit, constipation, remontées acides Anomalies du bilan sanguin : augmentation des enzymes hépatiques, baisse de la créatinine (fonction rénale) et de l'hémoglobine (anémie) Autres : rash, fatigue Troubles de la vision : vision floue, gêne à la lumière,
Certains effets nécessitent une attention particulière	Risque d'hyperglycémie, surveillance renforcée pour les <i>patients diabétiques</i>
QUAND ALERTER L'ÉQUIPE MÉDICALE?	

<p>Alerter l'équipe médicale dans les conditions suivantes et en l'absence de recommandations médicales spécifiques</p>	<p>Troubles digestifs</p> <ul style="list-style-type: none"> > En cas de perte de poids importante et/ou rapide > Diarrhées très fréquentes, plus de 4 selles par jour > Douleur intense dans le ventre > Impossibilité de boire pendant 24 h et/ou de manger pendant environ 48h. > Moins de 3 selles par semaine <p>Symptômes évocateurs d'un trouble au niveau des poumons</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aggravation d'une toux persistante ou difficulté respiratoire <p>Symptômes d'une hyperglycémie</p> <ul style="list-style-type: none"> > Envie importante et fréquente de boire, de manger et d'uriner associée à une fatigue <p>Symptômes évocateurs d'un trouble cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> > Essoufflement, manque d'énergie, vertiges > Gonflement des jambes (œdèmes) > Lèvres ou peau bleues
---	--

COMMENT PRÉVENIR LES EFFETS INDÉSIRABLES?

Poids	<p>Surveillez régulièrement votre poids en cas de troubles digestifs ou d'apparition d'œdèmes (gonflement des jambes)</p>
Yeux	<p>Évitez le port de lentilles de contact Évitez de conduire en cas de faible luminosité</p>
Constipation	<p><i>Pour stimuler le transit, pratiquez une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport...</i></p>
Soins de la peau	<p>Privilégiez pour la toilette un savon doux et un agent hydratant, un séchage par tamponnement. Évitez toute utilisation de produits irritants. <i>Pour se protéger du soleil, utilisez un écran total et évitez les expositions.</i></p>
Fatigue	<p>Privilégiez des activités qui procurent un bien-être, en particulier une activité physique adaptée et régulière : marche, jardinage, nage, vélo, sport... Alternez période d'activité et de repos.</p>

COMMENT ADAPTER VOTRE ALIMENTATION?

Diarrhées	<p>Privilégiez une alimentation pauvre en fibres. Consommez de préférence des féculents, des carottes, des bananes. Évitez de consommer des fruits et légumes crus, des laitages, du café et de l'alcool. Buvez de l'eau de façon abondante</p>
Nausées	<p>Privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, des aliments liquides et froids. Limitez les aliments gras, frits et épicés</p>

Perte de poids	Privilégiez une alimentation plus calorique et une «alimentation plaisir»
Constipation	Privilégiez une alimentation enrichie en fibres. Buvez de l'eau de façon abondante.
Troubles hépatiques et prancréas	Evitez la consommation d'alcool.