



Що таке ЛЕНВІМА®

Назва препарату	Опис
Ленватиніб	Желатинова капсула 10 мг: двокольорова жовта/червоно-помаранчева Желатинова капсула 4 мг: червоно-помаранчева

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто желатинових капсул 10 мг та желатинових капсул 4 мг, приймати один раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

У встановлений час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, з їжею чи без їжі									
Без перерви									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу функції нирок, печінки та щитовидної залози, наявність білка в сечі), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск, електрокардіограма).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ЛЕНВІМОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ЛЕНВІМИ® слід уникати вживання больдо, фукуса, азиатського женьшеню, пасифлори.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Найбільш поширені	<p>Порушення роботи серця: гіпертонія</p> <p>Порушення травлення: діарея, зниження апетиту, втрата ваги, нудота, блювота, запалення у роті (виразки)</p> <p>Проблеми зі шкірою: запалення долонь, підошв ніг та ділянок тертя</p> <p>Проблеми з м'язами: біль у суглобах та м'язах, біль в спині</p> <p>Інші: стомленість, зміна голосу, головні болі, крововиливи, кровотечі</p> <p>Відхилення в результатах лабораторних досліджень: протеїнурія (наявність білка в сечі), проблеми зі щитовидною залозою</p>
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p>Симптоми, що свідчать про гіпертонію:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головні болі, шум у вухах та (або) запаморочення > Збільшення показників артеріального тиску <p>Порушення травлення</p> <ul style="list-style-type: none"> > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі > Сильний біль у животі > Виділення, нарів або біль у задньому проході <p>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця</p> <ul style="list-style-type: none"> > Незвичайне прискорене серцебиття, біль або почуття стиснення в грудях > Слабкість в одному боці тіла, сильні головні болі, судоми, сплутаність свідомості, труднощі з розмовою, зміни зору або сильні запаморочення <p>Симптоми, що свідчать про крововилив</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кров у випорожненні чи у блювотних масах Гематоми (синці), носові кровотечі <p>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головні болі > Болі в суглобах > Біль чи запалення в кистях рук чи стопах
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу.
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Догляд за шкірою: кисті рук / стопи	Нанесіть зволожуючий крем або молочко, і (або) загоючий крем на кисті рук і ступні (не втираючи сильно). Уникайте піддавати кисті рук і ступні дії високих температур (гарячої води). Уникайте видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. Уникайте носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття.
Кровотечі, крововиливи	<p>Уникайте приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...)</p> <p>Повідомте свого лікаря:</p> <ul style="list-style-type: none"> > якщо ви приймаєте антикоагулянти або тромбоциттарні антиагреганти: необхідний ретельний моніторинг > про випадки хірургічного чи стоматологічного втручання.
ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Втрата ваги	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Нудота	<p>Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв.</p> <p>Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.</p>
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.

