



Что такое ЛЕНВИМА®

Название препарата	Описание
Ленватиниб	Желатиновая капсула 10 мг: двухцветная жёлтая/красно-оранжевая Желатиновая капсула 4 мг: красно-оранжевая

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. желатиновых капсул 10 мг и желатиновых капсул 4 мг, принимать один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, с едой или без еды										
Без перерыва										
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28	

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга функции почек, печени и щитовидной железы, содержания белка в моче), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЛЕНВИМОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЛЕНВИМЫ® следует избегать употребления больдо, фукуса, азиатского женьшеня, пассифлоры.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Нарушения работы сердца: гипертония</p> <p>Нарушения пищеварения: диарея, снижение аппетита, потеря веса, тошнота, рвота, воспаления во рту (язвы)</p> <p>Проблемы с кожей: воспаление ладоней, ступней ног и участков трения</p> <p>Проблемы с мышцами: боль в суставах и мышцах, боль в спине</p> <p>Прочие: усталость, изменение голоса, головные боли, кровоизлияния, кровотечения</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: протеинурия (наличие белка в моче), проблемы со щитовидной железой</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения > Увеличение показателей артериального давления <p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи > Сильная боль в животе Выделения, нарыв или боль в заднем проходе <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца</p> <ul style="list-style-type: none"> > Необычная одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди > Слабость в одной стороне тела, сильные головные боли, судороги, спутанность сознания, трудности с речью, изменения зрения или сильные головокружения <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли > Боли в суставах > Боль или воспаление в кистях рук или стопах
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес .
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Уход за кожей: кисти рук / стопы	Наносите крем или увлажняющее молочко, и (или) заживляющий крем на кисти рук и стопы (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви..
Кровотечения, кровоизлияния	Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: > о приеме антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов : необходим тщательный мониторинг > о случаях хирургического или стоматологического вмешательства .
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Воспаления во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

