



Что такое БЕЛУСТИН®

| Название препарата | Описание |
|--------------------|----------------------------------|
| Ломустин | Желатиновая капсула 40 мг: синяя |

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг / недель, т.е. желатиновых капсул 40 мг, принимать **1 раз каждые неделю.**

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время, через 3 часа после ужина.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

| Один раз, в установленное время, через 3 часа после ужина | ☺ | | | | | ☺ | | | | | натошак > 3 ч | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---------------|--|
| Принимать 1 день через каждые 6 недель | ☑ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ... | ☑ | ☒ | ☒ | ... | | |
| Принимать 1 день через каждые 3 недели | ☑ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ... | ☑ | ☒ | ☒ | ... | | |

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в больничной аптеке.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции печени и почек), а также мониторинг клинического состояния (tests respiratoires дыхательные тесты).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между БЕЛУСТИНОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме БЕЛУСТИНА® следует избегать употребления добавок из оливкового листа.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



| | |
|--|--|
| Самые распространённые | Отклонения в результатах лабораторных исследований: низкое содержание белых кровяных телец (лейкопения), низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения) Нарушения пищеварения: тошнота, рвота (через 3 – 6 часов после приёма БЕЛУСТИНА® и до 24 часов после приёма) Бесплодие у мужчины и у женщины |
| Некоторые пациенты требуют особого внимания | Пациенты с непереносимостью лактозы Пациенты с целиакией |
| О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ? | |
| Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций | Нарушения пищеварения > Существенная и (или) быстрая потеря > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Симптомы, свидетельствующие об инфекции > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой Респираторные заболевания Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии > Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения |
| КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ? | |
| Обращение с противораковым препаратом | Избегайте контакта капсул с кожей. Носите перчатки и мойте руки после обращения с препаратом. |
| Бесплодие | Перед началом лечения узнайте у своего врача о способах сохранения овоцитов и гамет. |
| Инфекция | Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит. |
| Кровотечения | Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: > о приёме <i>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов</i> : необходим тщательный мониторинг > о случаях <i>хирургического или стоматологического вмешательства</i> . |
| Вес | При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес. |
| Гигиена полости рта | Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт. |
| КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ? | |
| Тошнота | Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи. |

