



## Що таке ПУРІНЕТОЛ®

| Назва препарату | Опис                       |
|-----------------|----------------------------|
| Меркаптопурин   | Пігулка 50 мг: блідо-жовта |

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: ..... мг/день, тобто пігулок 50 мг, один раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У разі труднощів із ковтанням пігулок, дізнайтеся про існуючу пероральну суспензію.

У встановлений час. З проміжком часу між прийомом ліків та прийомом їжі чи споживанням молока: за 1 годину до або через 3 години після їжі (бажано ввечері).

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

## Дозування – схема приймання

|   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |         |
|---|----|----|----|----|----|----|----|--|--|---------|
| Один раз на день, у встановлений час, через 3 години після вечері |    |    |    |    |    |    |    |  |  | увечері |
| Без перерви   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |         |
|   | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 |  |  | Д28     |

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові, функції печінки та підшлункової залози), а також моніторинг клінічного стану.

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ПУРІНЕТОЛОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

*Приклад:* При прийманні ПУРІНЕТОЛУ® слід уникати вживання добавок з оливкового листа та алкоголю.

При прийманні ПУРІНЕТОЛУ® протипоказані деякі (живі) вакцини.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

### ПОБІЧНІ ЯВИЩА



|   |   |
|---|---|
| Найбільш поширені                         | <b>Відхилення в результатах лабораторних досліджень:</b> низька кількість лейкоцитів (лейкопенія) та тромбоцитів (тромбоцитопенія), низький рівень гемоглобіну (анемія), відхилення від норми печінкових проб<br><b>Порушення травлення:</b> нудота, блювота, діарея, запалення у роті (виразки), втрата ваги |
| Деякі пацієнти потребують особливої уваги | Пацієнти з непереносимістю лактози<br>Пацієнти – носії вірусу гепатита Б та герпесвірусу  |

**ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?**

|   |   |
|---|---|
| Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій | <b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b><br>> Температура > 38,5 °C<br>> Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою<br><b>Порушення травлення</b><br>> Суттєва та (або) швидка втрата ваги<br>> Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу<br>> Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі<br>> Сильний біль у животі<br>> Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин |
|---|---|

**ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Інфекція               | <b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить |
| Вага                   | При розладах травлення <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>  |
| Гігієна порожнини рота | <b>Використовуйте</b> м'яку зубну щітку, <b>використовуйте</b> ополаскувачі для рота, що містять питну соду. <b>Уникайте</b> ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.                               |
| Догляд за шкірою       | <i>Для захисту від сонця</i> <b>використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.   |

**ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Нудота                     | <b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв.<br><b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.  |
| Діарея                     | <b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль моркву, банани.<br><b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю.<br><b>Пийте</b> більше води. |
| Запалення у роті (виразки) | <b>Уникайте</b> вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.  |
| Втрата ваги                | <b>Робіть вибір на користь</b> більш калорійної дієти та «дієти задоволення».  |

