



## Что такое ПУРИНЕТОЛ®

Название препарата	Описание
Меркаптопурин	Таблетка 50 мг: бледно-жёлтая

## Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: ..... мг/день, т.е. ..... таблеток 50 мг, один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

В случае трудностей с глотанием таблеток, узнайте о существующей пероральной суспензии.

В установленное время. С промежутком времени между приёмом лекарства и приёмом пищи или употреблением молока: за 1 час до или через 3 часа после еды (желательно вечером).

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

## Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, через 3 часа после еды										вечером
Без перерыва										
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28	

## Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

## Что ещё нужно знать?

### Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции печени и поджелудочной железы), а также мониторинг клинического состояния.

### Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

### Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ПУРИНЕТОЛОМ® и другими Вашими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

*Пример:* При приёме ПУРИНЕТОЛА® следует избегать употребления добавок из оливкового листа и алкоголя.

При приёме ПУРИНЕТОЛА® противопоказаны некоторые (живые) вакцины.

## Каковы возможные побочные явления?

**Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.**

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	<p><b>Отклонения в результатах лабораторных исследований:</b> низкое содержание лейкоцитов (лейкопения) и тромбоцитов (тромбоцитопения), низкий уровень гемоглобина (анемия), отклонение от нормы печёночных проб</p> <p><b>Нарушения пищеварения:</b> тошнота, рвота, диарея, воспаления во рту (язвы), потеря веса</p>



Некоторые пациенты требуют особого внимания	Пациенты с непереносимостью лактозы Пациенты – носители вируса гепатита Б и герпесвируса
<b>О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?</b>	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<b>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</b> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой > <b>Нарушения пищеварения</b> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов
<b>КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?</b>	
Инфекция	<b>Избегайте</b> посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть <b>рекомендована прививка</b> от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Вес	При расстройствах пищеварения <b>регулярно проверяйте свой вес.</b>
Гигиена полости рта	<b>Используйте</b> мягкую зубную щетку, <b>используйте</b> ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. <b>Избегайте</b> ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Уход за кожей	<b>Для защиты от солнца используйте</b> крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и <b>избегайте</b> воздействия солнечных лучей.
<b>КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?</b>	
Тошнота	<b>Делайте выбор в пользу</b> дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. <b>Ограничьте</b> потребление жирной, жареной и острой пищи.
Диарея	<b>Делайте выбор в пользу</b> диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно <b>употреблять</b> продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. <b>Избегайте</b> употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. <b>Пейте</b> побольше воды.
Воспаление во рту (язвы)	<b>Избегайте</b> употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.
Потеря веса	<b>Делайте выбор в пользу</b> более калорийной диеты и «диеты удовольствия».

