



## Що таке Мідостаурін

Назва препарату	Опис
РІДАПТ®	Капсула 25 мг: помаранчева 

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.




У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто . желатинових капсул 25 мг 2 рази на день  
..... (вказіть, приймати безперервно чи ні)

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

У встановлений час, під час їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

## Дозування – схема приймання

2 рази на день, у встановлений час, під час їжі			
Безперервно (монотерапія) або з перервами згідно з протоколом (у поєднанні)			

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, глюкози крові, рівня калію та функції печінки), а також моніторинг клінічного стану (електрокардіограма).

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між мідостауріном та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

*Приклад:* При прийманні РІДАПТУ® слід уникати вживання звіробію та грейпфруту.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**



ПОБІЧНІ ЯВИЩА	
Найбільш поширені	<p><b>Відхилення в результатах лабораторних досліджень:</b> зниження кількості білих кров'яних тілець (лейкопенія – нейтропенія), тромбоцитів (тромбоцитопенія), низький рівень гемоглобіну (анемія), гіперглікемія</p> <p><b>Порушення травлення:</b> нудота, блювота, діарея, запалення в роті (виразки)</p> <p><b>Проблеми зі шкірою:</b> висип, сухість, реакція на сонце</p> <p><b>Порушення роботи серця,</b> зокрема гіпо- або гіпертонія, набряклість ніг та (або) рук</p> <p><b>Респіраторні захворювання:</b></p> <p><b>Інші:</b> носовые кровотечення, головний біль, біль у суглобах</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Пацієнти з діабетом (гіперглікемія)
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p><b>Порушення травлення:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</li> <li>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</li> <li>&gt; Сильний біль у животі</li> <li>&gt; Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою</li> </ul> <p><b>Респіраторні захворювання:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Постійний посилюючий кашель чи утруднене дихання</li> </ul> <p><b>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Головний біль</li> <li>&gt; Біль у суглобах</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Задишка, прискорене серцебиття, біль або почуття стиснення в грудях</li> </ul>
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Вага	При розладах травлення або набряках <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
Інфекція	<b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить
Догляд за шкірою	<b>Робіть вибір на користь</b> м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. <b>Уникайте</b> використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <b>Для захисту від сонця використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується <b>регулярно вимірювати</b> артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль моркву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.

