



Що таке ЛІСОДРЕН®

Назва препарату	Опис
Мітотан	Пігулка 500 мг: біла, з насічкою

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке:..... мг на день, тобто пігулок 500 мг, приймати..... разів на день, щодня. Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У встановлений час, з багатою жирами їжею.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

2 - 3 рази на день, у встановлений час, під час їжі (з багатою жирами їжею)									
Без перерви									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки та щитовидної залози, рівня холестерину та тригліцеридів), а також моніторинг клінічного стану.

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ЛІСОДРЕНОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ЛІСОДРЕНУ® слід уникати вживання лопуху, больдо, огірочної трави, гінґо білоба, комірника в'язолистного, червоного клеверу.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА	
Найбільш поширені	<p>Порушення травлення: блювота, діарея, нудота, кислотний рефлюкс, втрата ваги</p> <p>Неврологічні розлади: сонливість, запаморочення, сплутаність свідомості, відчуття мурашок по тілу, порушення чутливості</p> <p>Відхилення в результатах лабораторних досліджень: відхилення від норми печінкових проб, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія, низька кількість білих кров'яних тілець (лейкопенія) та тромбоцитів (тромбоцитопенія), низький рівень гемоглобіну (анемія)</p> <p>Інші: шкірний висип, стомленість, кровотечі, м'язова стомленість, чутливість та припухлість грудей</p> <p>Недостатність наднирників</p>



ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?			
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p>Симптоми, що свідчать про інфекцію</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою <p>Травматизм, шок</p> <p>Симптоми, що свідчать про крововилив</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кров у випорожненні чи у блювотних масах Гематоми (синці), носові кровотечі <p>Порушення травлення</p> <ul style="list-style-type: none"> > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин <p>Неврологічні розлади</p> <ul style="list-style-type: none"> > Розлади моторики та координації > Ненормальні відчуття, такі як поколювання, відчуття мурашок по тілу > Втрата пам'яті, труднощі з концентрацією уваги, труднощі з розмовою > Запаморочення <p>Недостатність наднирників</p> <ul style="list-style-type: none"> > Стомленість, болі в животі, нудота, блювота, діарея, сплутаність свідомості 		
ЯК ЗАПОБИТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?			
Недостатність наднирників	<p>Носіть із собою картку пацієнта, який приймає ЛІСОДРЕН®. У разі надзвичайної ситуації медперсонал повинен знати, що Ви проходите курс лікування ЛІСОДРЕНОМ®.</p> <p style="text-align: center;">КАРТА ПАЦІЄНТА, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ ЛІСОДРЕН</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"> <p>Я проходжу лікування Лісодреном (мітотаном)</p> <p>У мене більш високий ризик недостатності наднирків.</p> <p>У випадку, якщо потрібна невідкладна допомога, повинні бути вжиті відповідні профілактичні заходи.</p> </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <p>Прізвище мого лікаря: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Для отримання інформації про цей продукт слід зв'язатися з:</p> <p>Laboratoire HRA Pharma Тел.: +33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com</p> </td> </tr> </table>	<p>Я проходжу лікування Лісодреном (мітотаном)</p> <p>У мене більш високий ризик недостатності наднирків.</p> <p>У випадку, якщо потрібна невідкладна допомога, повинні бути вжиті відповідні профілактичні заходи.</p>	<p>Прізвище мого лікаря: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Для отримання інформації про цей продукт слід зв'язатися з:</p> <p>Laboratoire HRA Pharma Тел.: +33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com</p>
<p>Я проходжу лікування Лісодреном (мітотаном)</p> <p>У мене більш високий ризик недостатності наднирків.</p> <p>У випадку, якщо потрібна невідкладна допомога, повинні бути вжиті відповідні профілактичні заходи.</p>	<p>Прізвище мого лікаря: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Для отримання інформації про цей продукт слід зв'язатися з:</p> <p>Laboratoire HRA Pharma Тел.: +33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com</p>		
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу.		
Кровотечі, крововиливи	<p>Уникайте приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...)</p> <p>Повідомте свого лікаря:</p> <ul style="list-style-type: none"> > якщо ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i>: необхідний ретельний моніторинг > про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання. 		
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.		
Догляд за шкірою	<p>Робіть вибір на користь м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням.</p> <p>Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру.</p> <p>Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.</p>		
Поводження з протираковим препаратом	Уникайте контакту капсул зі шкірою. Носіть рукавички та мийте руки після поведження з препаратом.		
ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?			
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.		
Діарея	<p>Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркву, банани.</p> <p>Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю.</p> <p>Пийте більше води.</p>		
Втрата ваги	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».		

