



Что такое ЛИСОДРЕН®

Название препарата	Описание
Митотан	Таблетка 500 мг: белая, с насечкой

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг в день, т.е. таблеток 500 мг, принимать..... раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

Принимать в установленное время, с богатой жирами пищей.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 - 3 раза в день, в установленное время, во время еды (с богатой жирами пищей)									
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени и щитовидной железы, уровня холестерина и триглицеридов), а также мониторинг клинического состояния.

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЛИСОДРЕНОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЛИСОДРЕНА® следует избегать употребления лопуха, больдо, огуречной травы, гинкго билоба, лабазника вязолистного, красного клевера.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: рвота, диарея, тошнота, кислотный рефлюкс, потеря веса</p> <p>Неврологические расстройства: сонливость, головокружения, спутанность сознания, ощущение ползания мурашек, нарушения чувствительности</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: отклонение от нормы печёночных проб, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, низкое содержание белых кровяных телец (лейкопения) и тромбоцитов (тромбоцитопения), низкий уровень гемоглобина (анемия)</p> <p>Прочие: кожная сыпь, усталость, кровотечения, мышечная усталость, чувствительность и припухлость груди</p> <p>Недостаточность надпочечников</p>		
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?			
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой <p>Травматизм, шок</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения <p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов <p>Неврологические расстройства</p> <ul style="list-style-type: none"> > Нарушения моторики и координации > Ненормальные ощущения, такие как покалывание, ощущение ползания мурашек > Потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, трудности с речью Головокружения <p>Недостаточность надпочечников</p> <ul style="list-style-type: none"> > Усталость, боли в животе, тошнота, рвота, диарея, спутанность сознания 		
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?			
Недостаточность надпочечников	<p>Носите с собой карту пациента, принимающего ЛИСОДРЕН®. В случае чрезвычайной ситуации медперсонал должен знать, что Вы проходите курс лечения ЛИСОДРЕНОМ®.</p> <p style="text-align: center;">КАРТА ПАЦИЕНТА, ПРИНИМАЮЩЕГО ЛИСОДРЕН</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> <p>Я прохожу лечение Лисодреном (митотаном)</p> <p>У меня более высокий риск недостаточности надпочечников.</p> <p>В случае, если мне потребуется неотложная помощь, должны быть приняты соответствующие профилактические меры.</p> </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <p>Фамилия моего врача: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Для получения информации о данном продукте следует связаться с:</p> <p style="text-align: center;">Laboratoire HRA Pharma Тел.: +33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com</p> </td> </tr> </table>	<p>Я прохожу лечение Лисодреном (митотаном)</p> <p>У меня более высокий риск недостаточности надпочечников.</p> <p>В случае, если мне потребуется неотложная помощь, должны быть приняты соответствующие профилактические меры.</p>	<p>Фамилия моего врача: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Для получения информации о данном продукте следует связаться с:</p> <p style="text-align: center;">Laboratoire HRA Pharma Тел.: +33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com</p>
<p>Я прохожу лечение Лисодреном (митотаном)</p> <p>У меня более высокий риск недостаточности надпочечников.</p> <p>В случае, если мне потребуется неотложная помощь, должны быть приняты соответствующие профилактические меры.</p>	<p>Фамилия моего врача: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Для получения информации о данном продукте следует связаться с:</p> <p style="text-align: center;">Laboratoire HRA Pharma Тел.: +33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com</p>		
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес.		
Кровотечения, кровоизлияния	<p>Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...)</p> <p>Сообщите своему врачу:</p> <ul style="list-style-type: none"> > о приёме <i>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов</i>: необходим тщательный мониторинг > о случаях <i>хирургического или стоматологического вмешательства</i>. 		
Усталость	<p>Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт...</p> <p>Чередуйте периоды активности и отдыха.</p>		
Уход за кожей	<p>Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием.</p> <p>Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу.</p> <p>Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.</p>		
Обращение с противораковым препаратом	Избегайте контакта капсул с кожей. Носите перчатки и мойте руки после обращения с препаратом.		
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?			
Тошнота	<p>Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд.</p> <p>Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.</p>		
Диарея	<p>Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы.</p> <p>Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя.</p> <p>Пейте побольше воды.</p>		
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».		

