



Що таке ТАСІГНА®

Назва препарату	Опис
Нілотиніб	<p>Желатинова капсула 150 мг: червона Желатинова капсула 200 мг: жовта</p> 

Як треба приймати Ваші ліки?


Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто желатинових капсул 150 мг та (чи) желатинових капсул 200 мг. Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

У встановлений час. З проміжком часу між прийомом ліків та прийомом їжі (за 1 годину до їжі чи через 2 години після їжі).

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

2 рази на день, у встановлений час, за 1 годину до їжі чи через 2 години після їжі									
	< 1 год  2 год >	< 1 год  2 год >	< 1 год  2 год >						
Без перерви									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, рівня електролітів, таких як калій, глюкози крові, холестерину, функції печінки та підшлункової залози), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск, електрокардіограма).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ТАСІГНОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ТАСІГНИ® слід уникати вживання звіробую, грейпфруту, больдо, фукуса, азійського женьшеню, пасифлори.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Найбільш поширені	<p>Порушення травлення: нудота, блювота, діарея, закріп та біль в животі</p> <p>Загальні розлади: набряк кінцівок та (чи) обличчя</p> <p>Відхилення в результатах лабораторних досліджень: зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія), багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія), низький рівень гемоглобіну (анемія), відхилення від норми печінкових проб та и проб підшлункової залози, підвищений рівень холестерину та тригліцеридів</p> <p>Біль: біль у м'язах та суглобах, головний біль</p> <p>Проблеми зі шкірою: шкірний висип, сухість шкіри, свербіж та випадання волосся</p> <p>Порушення роботи серця: сильне, швидке або нерегулярне серцебиття, задишка, біль у грудях</p> <p>Стомленість</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	<p>Пацієнти – носії вірусу гепатита Б</p> <p>Пацієнти з аритмією в анамнезі</p>
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p>Порушення травлення</p> <ul style="list-style-type: none"> > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин <p>Випорожнення рідше 3 разів на тиждень</p> <p>Симптоми, що свідчать про інфекцію</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою <p>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головний біль > Біль у суглобах <p>Симптоми, що свідчать про утримання води</p> <ul style="list-style-type: none"> Занадто швидке та несподіване збільшення ваги <p>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця</p> <ul style="list-style-type: none"> > Задишка, прискорене серцебиття, біль або стиснення в грудях
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Догляд за шкірою	<p>Робіть вибір на користь м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням.</p> <p>Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру.</p> <p>Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.</p>
Вага	При розладах травлення або утриманні води регулярно перевіряйте свою вагу.
Утримання води (набряки кінцівок)	Уникайте занадто тісного одягу, шкарпеток та взуття. Кладіть ноги у високе положення.
Інфекція	Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить
Закріп	Для стимулювання кишечного транзиту займайтеся підібраними та регулярними видами фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт...
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Біль у суглобах	Займайтеся підібраними видами фізичного навантаження.
Випадання волосся	Використовуйте невелику кількість м'якого шампуню (для немовлят). Робіть вибір на користь м'якої щітки. Уникайте занадто частого миття волосся. Уникайте джерел тепла (фена, нагрітих бігуді, гарячого утюжка), барвників, мелірування та хімічної завивки.
ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Утримання води	Робіть вибір на користь дієти з низькою кількістю солі.
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте більше води.
Проблеми з функцією підшлункової залози	Уникайте вживання алкоголю.

